UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS DE CHAPADÃO DO SUL

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA

ALINE SANT'ANNA MONQUEIRO

**DIAGNOSE NUTRICIONAL E NORMAS PARA O FEIJOEIRO DE PRIMEIRA
SAFRA EM MONTIVÍDIU, GOIÁS**

CHAPADÃO DO SUL – MS

2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMPUS DE CHAPADÃO DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA

ALINE SANT' ANNA MONQUEIRO

**DIAGNOSE NUTRICIONAL E NORMAS PARA O FEJÓEIRO DE PRIMEIRA
SAFRA EM MONTIVÍDIU, GOIÁS**

Orientador: Prof. Dr. Sebastião Ferreira de Lima

Dissertação apresentada à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para obtenção do título de Mestre em Agronomia, área de concentração: Produção Vegetal.

CHAPADÃO DO SUL – MS
2018

Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Campus de Chapadão do Sul

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

DISCENTE: Aline Sant' Anna Monqueiro

ORIENTADOR (A): Prof. (a) Dr. (a) Sebastião Ferreira de Lima

**DIAGNOSE NUTRICIONAL E NORMA DRIS PARA O FEIJOEIRO DE
PRIMEIRA SAFRA EM MONTIVIDIU - GO**

Prof.(a) Dr.(a) Presidente Sebastião Ferreira de Lima

Prof.(a) Dr.(a) Rita de Cassia Felix Alvarez

Prof.(a) Dr.(a) Matildes Blanco

Chapadão do Sul, 03 de Abril de 2018.

Aos meus pais Paulo Sérgio Monqueiro e Darlete Monqueiro,
por todo o apoio e ensinamento de vida para lutar pelos nossos sonhos.

Ao meu companheiro de vida, Marcelo Rodrigues Alves Guerra,
pela ajuda, compreensão e carinho em todo momento.

Ao meu Orientador, Sebastião Ferreira de Lima,
pela amizade e auxílio.

Dedico

AGRADECIMENTOS

Nessa vida não somos nada sozinho, com isso primeiramente temos que agradecer a quem nos acompanha diariamente em nossos passos, Deus. E aqueles que carregamos diariamente em nossos corações.

Aos meus pais Paulo Sérgio Monqueiro e Darlete Monqueiro por sempre me apoiarem em minhas decisões e por todo auxílio que recebi nos momentos que mais precisei.

Ao Marcelo Rodrigues Alves Guerra, por estar ao meu lado em todos os momentos e pela paciência diária em nossa vida.

À Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Chapadão do Sul, MS e ao Programa de Pós-graduação em agronomia pela oportunidade da realização do curso de mestrado.

Aos professor Sebastião e Ana Paula, pelas muitas conversas ao longo dos anos. Pela orientação, confiança e ensinamentos durante o programa do mestrado.

Aos professores Rita de Cassia Felix Alvarez e Matildes Blanco, pela participação na banca, contribuição e considerações ao trabalho.

A todos os professores do Programa de Pós-graduação em agronomia, pelo conhecimento transmitido e auxílio e compreensão no momento que foi necessário.

Ao Técnico da Secretaria de Pós-Graduação Sinomar Moreira Andrade, por auxiliar nos procedimentos necessários para realizar durante a pós graduação.

A Usina Cerradinho Bio, por permitir iniciar o mestrado e incentivar o crescimento profissional e pessoal.

A Fazenda Monte Alegre em permitir concluir e conduzir o trabalho em suas instalações

As minhas meninas pelo pensamento positivo e todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, meus agradecimentos.

“TALVEZ NÃO TENHA CONSEGUIDO FAZER O MELHOR, MAS LUTEI PARA QUE O MELHOR FOSSE FEITO. NÃO SOU O QUE DEVERIA SER, MAS GRAÇAS A DEUS, NÃO SOU O QUE ERA ANTES.”

Marthin Luther King

RESUMO

A avaliação nutricional pela análise foliar possibilita verificar a capacidade da cultura de absorver os nutrientes e diagnosticar os fatores nutricionais limitantes para a produção, evidenciando a importância para a cultura do feijão devido ao ciclo reduzido e sistema radicular nas camadas superficiais do solo. O objetivo do trabalho foi diagnosticar os nutrientes e interações mais limitantes para aumento da produtividade no feijoeiro pela metodologia das faixas de suficiência. O experimento foi conduzido no município de Montividiu-GO, utilizouse a cultivar BRSMG Madrepérola com semeadura no início de outubro. Houve o estabelecimento de 7 glebas homogêneas, onde foram coletadas 7 amostras compostas em cada, totalizando 49 amostragens. Uma amostra composta era formada por 30 subamostras, retirando a primeira folha totalmente expandida na época do florescimento. Realizou a interpretação dos resultados com método tradicional de faixas de suficiência, e também pela metodologia DRIS. Constatou-se pela metodologia de Malavolta (1997), que o enxofre (S) é o elemento com menor absorção no feijoeiro (98%), enquadrando como deficiente para a cultura. Outro problema diagnosticado foi a correlação negativa do nitrogênio com os demais nutrientes, sendo exceção do ferro e zinco. Entretanto, os resultados obtidos pelo desenvolvimento do DRIS para alguns nutrientes não foram semelhantes de Malavolta (1997). Em ambas metodologias, o nitrogênio é o nutriente com maior frequência na classe de excesso nas plantas de feijão. Porém o elemento S diferiu, enquadrando 88% das amostras como suficientes. Concluindo dessa forma a importância da diagnose nutricional regionalizada para as culturas.

PALAVRAS-CHAVES: Feijoeiro; análise foliar; estado nutricional.

ABSTRACT

The nutritional evaluation for foliar analysis makes it possible to verify the capacity of the nutrient absorption culture and to diagnose the nutritional limiting factors for the production, evidencing an importance for a bean crop due to the reduced cycle and root system in the superficial layers of the soil. The objective of this study was to diagnose the most limiting nutrients and interactions to increase the production without bean by the methodology of the ranges of sufficiency. The experiment was conducted in the county of Montividiu-GO, using BRSMG Madrepérola with sowing in early October. There were 7 homogeneous areas, where 7 samples were collected each, totaling 49 samplings. A composite sample consisted of 30 subsamples, removing a first fully expanded leaf at the time of flowering. With the data banks formed, performed the interpretation of the results using traditional method of sufficiency ranges, and also by the DRIS methodology. For the interpretation of the foliar results by the traditional methodology, the values were submitted to univariate statistical test and frequency distribution, besides performing Pearson Linear Correlation, with 5 and 1%, by the t test. It was verified that the sulfur (S) is the element with lower absorption in the bean plant (98%), being considered as deficient for the crop. Another problem diagnosed was the negative correlation of nitrogen with other nutrients, except for iron and zinc. However, the results obtained by the development of DRIS for some nutrients were not similar to the existing literature. In both methodologies, nitrogen is the nutrient most frequently in the excess class in bean plants. However the element S, there were different results, where the S would be with 88% of the samples framed as sufficient. This concludes the importance of regionalized nutritional diagnosis for crops.

KEYWORDS: Common bean; analyze leaf; nutritional status.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA		PÁGINA
	CAPÍTULO 2	
1	Equação de regressão polinomial entre as produtividades (sc ha ⁻¹) (Y) e índice de equilíbrio nutricional – IBN (X) e coeficiente de regressão (r ²) obtidos pelos 49 pontos de amostragem, na cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra no município de Montividiu, GO.....	58
2	Equação de regressão polinomial entre os teores de macronutrientes da variável (Y) e o seu índice DRIS (X) na análise foliar e coeficiente de regressão (r ²) obtidos pelos 49 pontos de amostragem, na cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra no município de Montividiu, GO.....	59
3	Equação de regressão polinomial entre os teores de micronutrientes da variável (Y) e o seu índice DRIS (X) na análise foliar e coeficiente de regressão (r ²) obtidos pelos 49 pontos de amostragem, na cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra no município de Montividiu, GO.....	60

LISTA DE TABELAS

TABELA		PÁGINA
CAPÍTULO 1		
1	Classes de interpretação para os nutrientes N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn, Zn, B, Co e Mo, obtidos pela análise foliar do feijoeiro, pela faixas de suficiência.....	23
2	Valores mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação para os teores de macro e micronutrientes obtidos pela análise de folha em 49 amostras na cultura do feijão sequeiro no município de Montividiu, GO, 2017.....	25
3	Distribuição de frequência dos elementos químicos: N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn, obtidos pela amostragem de folha em 49 pontos avaliados, na cultura do feijão sequeiro, no município de Montividiu, GO, 2017.....	27
4	Correlação linear de Pearson entre os nutrientes da folha de feijão...	29
CAPÍTULO 2		
1	Concentração adequada de nutrientes em folhas do feijoeiro comum segundo vários autores	39
2	Normas foliares DRIS (média, desvio padrão e coeficiente de variação) para os nutrientes e suas relações dois a dois, para população de baixa e alta produtividade do feijão sequeiro, no município de Montividiu, GO, safra 2016/17 (n= 49 amostras).....	44
3	Índices DRIS calculados pelo procedimento de Beauflis (1973) e Índice de Balanço Nutricional (IBN) (Beaufils, 1973; Walworth & Sumner, 1987) obtidos pelas análises foliar para cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra em 49 pontos de amostragem de folhas no município de Montividiu, GO. Safra 2016/17	51

4	Porcentagem de ocorrência dos nutrientes mais limitantes por deficiência, diagnosticados pelos índices DRIS, obtidos pela análise foliar para cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra em 49 pontos de amostragem de folhas no município de Montividiu, GO. Safra 2016/17	55
5	Porcentagem de ocorrência dos nutrientes mais limitantes por excesso, diagnosticados pelos índices DRIS, obtidos pela análise foliar para cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra em 49 pontos de amostragem de folhas no município de Montividiu, GO. Safra 2016/17	56
6	Ponto de equilíbrio das variáveis, N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn, obtidos pela análise foliar em 49 pontos de amostragem, na cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra no município de Montividiu, GO	61
7	Faixas de suficiência das variáveis N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn, obtidos pelo desenvolvimento da metodologia DRIS para a cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra no município de Montividiu, GO	62
8	Distribuição de frequência das variáveis, N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn, obtidos pela análise foliar em 49 pontos de amostragem, na cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra no município de Montividiu, GO	63

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	1
2.	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	3
2.1.	O feijão comum.....	3
2.2.	Análise foliar: método de diagnose do estado nutricional das culturas.....	5
2.3.	Interpretação das análises foliares.....	7
2.3.1.	Método das faixas de suficiencia (FS).....	7
2.3.2	Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação.....	8
2.3.2.1.	Normas DRIS.....	9
2.3.2.2	Calculo e interpretação dos índices.....	10
3.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	11
	CAPÍTULO 1 – DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL FOLIAR DO FEIJÃO SEQUEIRO NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU, GO, UTILIZANDO O MÉTODO DAS FAIXAS SUFICIÊNCIA.....	18
	RESUMO.....	18
1.	INTRODUÇÃO.....	20
2.	MATERIAL E MÉTODOS.....	21
3.	RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	24
4.	CONCLUSÕES.....	30
5.	REFERÊNCIAS.....	30
	CAPÍTULO 2 – ESTABELECIMENTO DE NORMAS DRIS PARA A CULTURA DO FEIJÃO SEQUEIRO PRIMEIRA SAFRA NO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU, GO	33
	RESUMO.....	33
1.	INTRODUÇÃO.....	35
2.	MATERIAL E MÉTODOS.....	37
3.	RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	43
4.	CONCLUSÃO.....	64
5.	REFERÊNCIAS.....	64
	APÊNDICES CAPÍTULO 1 E 2.....	69
	ANEXOS CAPITULO 1 E 2.....	72

1. INTRODUÇÃO

A cultura do feijão comum (*Phaseolus vulgaris* L.) é amplamente difundida no Brasil, podendo ser distribuída em três períodos, primeira safra (das águas), segunda safra (da seca) e terceira safra (de inverno), encontrada principalmente em produtores com alta tecnologia obrigatoriamente com acesso à irrigação, caracterizando o Brasil como terceiro maior produtor mundial, atrás de Myanmar e Índia (Conab 2017). Na safra 2016/17 o Brasil atingiu uma produção total de 3,2 milhões de toneladas, sendo que o Centro-Oeste contribuiu com 14,9% deste valor, tendo o estado de Goiás com a maior produtividade brasileira, 2.507 kg ha⁻¹ (Conab 2018).

O aumento da produtividade do feijoeiro está intimamente relacionado a nutrição mineral ofertada a planta, sendo a exigência nutricional da cultura alta, justificado pelo sistema radicular pouco desenvolvido e superficial, além do seu ciclo curto. Dessa forma, é fundamental que o nutriente seja colocado à disposição da planta, em tempo e local adequados (Rosolem & Marubayashi 1994). No entanto, nem sempre o manejo nutricional aplicado a cultura, resulta em produtividade esperada, sendo indicado realizar uma avaliação foliar para o acompanhamento da nutrição da planta. Para atingir esse nível de informação torna-se fundamental a coleta adequada das folhas e sua consequente análise química.

A análise química das folhas fornece um panorama da nutrição da planta em um determinado período de desenvolvimento da cultura, normalmente na época de maior necessidade nutricional, sendo sem dúvidas, uma das melhores ferramentas para correlacionar a disponibilidade dos nutrientes no solo e a capacidade de absorção da planta de extrair os elementos químicos de forma eficiente (Vieira et al. 2010).

O uso da análise foliar, na diagnose do estado nutricional das plantas, tem como fundamento o fato de existir uma correlação entre sua taxa de crescimento ou de produção e o teor de nutrientes nos seus tecidos. Muitos fatores como cultivar, idade fisiológica e parte da planta a ser amostrada, podem interferir na composição das folhas. Contudo, anteriormente a

27 amostragem do material vegetal a ser analisado, é necessário que esses fatores estejam bem
28 definidos (Mesquita 2013). Com a análise química foliar disponibilizada para as devidas
29 avaliações, pode-se optar por uma metodologia de interpretação capaz de atender as
30 necessidades locais de informações sobre a nutrição da cultura.

31 Os métodos mais usuais para interpretação de análises químicas em folhas pressupõem
32 a comparação das concentrações de nutrientes encontradas, com valores de referência (Mourão
33 Filho et al. 2002). Quando o valor padrão corresponde ao teor do nutriente a partir do qual o
34 nível produtivo da cultura será igual ou maior que 90% da produtividade máxima, denomina-
35 se de nível crítico (NC) ou faixas de suficiência (FS) (Kurihara et al. 2005).

36 Na cultura do feijoeiro, a interpretação das análises foliares e a avaliação do estado
37 nutricional das plantas são realizadas, principalmente, pelos métodos do Nível Crítico Foliar
38 (NC) e Faixa de Suficiência (FS). Essas técnicas apresentam facilidade na interpretação dos
39 resultados analíticos, como também disponibilidade de valores padrões nutricionais na
40 literatura especializada (Souza & Lobato, 2004; Creste & Echer 2010).

41 Entretanto, outras metodologias podem ser utilizadas para interpretação das análises
42 foliares. O método Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação (DRIS), desenvolvido por
43 Beaufils (1971), tem o intuito de verificar o balanço entre os nutrientes e possibilita estimar as
44 faixas de suficiência (FS) e nível crítico (NC) no tecido foliar para cada nutriente em condições
45 de equilíbrio nutricional, a partir de um banco de dados coletados em campo, reduzindo assim,
46 as interferências e particularidades locais do ambiente quando comparado as metodologias
47 tradicionais de diagnose.

48 Dessa forma, o método DRIS tem sido apontado como vantajoso na interpretação dos
49 resultados de análise foliar, pois supre parte das limitações dos métodos univariados.
50 Entretanto, para obtenção de uma base de dados representativas, é necessário uma quantidade

51 substancial de valores médios da concentração de nutrientes, variâncias, desvio padrão e
52 coeficiente de variação de uma população de plantas altamente produtiva (Souza 2013).

53 Com a utilização do DRIS, é possível diagnosticar adequadamente o estado nutricional
54 da cultura do feijão, conseqüentemente, é possível realizar corretamente o manejo de adubação,
55 visando a diminuição dos processos agrícolas e os custo de produção, uma vez que pode ser
56 reduzida as aplicações de fertilizantes quando a planta já estiver em equilíbrio nutricional.

57 Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar o estado nutricional do feijoeiro, no
58 município de Montividiu, GO, na safra 2016/17, por meio das concentrações de nutrientes
59 determinadas por análise foliar e interpretadas pelo método das faixas de suficiência e
60 desenvolver o sistema integrado de diagnose e recomendação (DRIS).

61

62 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

63 2.1 O feijão comum

64 Originário do México e América Central, a cultura do feijão-comum (*Phaseolus*
65 *vulgaris* L.), após domesticação teve seu cultivo expandido por todo mundo, levada a outros
66 continentes, predominantemente pelos colonizadores europeus, tornando-se a espécie mais
67 cultivada dentro do gênero *Phaseolus* (Singh 1982; Santos & Gavilanes 2006; Papa et al. 2004).

68 A cultura do feijão possui grande interesse agrônômico no mundo, pois representa um
69 dos alimentos mais importantes da dieta alimentar humana (Angioi et al. 2010), principalmente
70 para países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, por apresentar fonte barata de proteínas,
71 ferro, cálcio, zinco, vitaminas do complexo B, carboidratos, fibras e lisina (Mesquita et al.
72 2007).

73 O feijão comum é morfológicamente diverso e apresenta variações em muitas de suas
74 características, como o hábito de crescimento (Campos et al. 2011). A cultura pode ser
75 classificada em quatro grupos: hábito determinado arbustivo (Tipo I), hábito indeterminado

76 arbustivo (Tipo II), hábito indeterminado prostrado (Tipo III) e hábito indeterminado trepador
77 (Tipo IV) (Nassar et al. 2010a). As diferenças de hábito de crescimento estão associadas
78 também ao ciclo da cultura, onde normalmente as cultivares do tipo I são mais precoces com
79 ciclos próximos de 70 dias, enquanto que as do tipo II, III e IV apresentam ciclo ao redor de 90
80 a 100 dias, ou até maior para as do tipo IV. No Brasil a grande maioria dos cultivos é com
81 plantas do tipo II e III (Mesquita 2013).

82 O fato do feijoeiro ser uma planta de ciclo curto, vem estimulando o produtor para seu
83 cultivo em rotação com outras espécies e em grandes áreas, sendo cultivado em praticamente
84 todos os Estados brasileiros, nas mais variadas condições edafoclimáticas, em diferentes épocas
85 e sistemas de cultivo, variando conforme a região. (Carneiro 2002; Ramos Junior et al. 2005).
86 Segundo Zimmermann & Teixeira (1996), a domesticação do gênero *Phaseolus* produziu perda
87 da sensibilidade ao fotoperíodo, eliminando este entrave que comumente afeta também outras
88 culturas da família das leguminosas. Fato esse, que, inclusive, é decisivo para o sucesso da safra
89 de terceira época. Não menos importante, o fator temperatura assume para o feijoeiro relevância
90 acentuada, sobretudo nos estádios de germinação e florescimento.

91 Além dos problemas relacionados ao fotoperíodo e temperatura, outro entrave para a
92 cultura do feijão é o sistema radicular pouco desenvolvido, que permanece nas camadas mais
93 superficiais do solo, dessa forma, é importante que o feijoeiro seja cultivado em solos com pH
94 em H₂O na faixa de 6,0 a 6,5, para maior eficiência do aproveitamento da fixação simbiótica,
95 evitando a fitotoxicidade de alumínio e prevenir a deficiência de micronutrientes, sendo ainda,
96 de fundamental importância, o efeito da calagem no crescimento radicular, o que torna a planta
97 mais apta a produzir, quando as condições hídricas são adversas (Rosolem 1996).

98 Para obter elevadas produtividades na cultura do feijão, são aspectos fundamentais a
99 correção do solo e a adubação. Para a prescrição da adubação de base ou de semeadura, a análise
100 de solo é a principal ferramenta, sendo, às vezes, auxiliada pelo nível de produtividade esperado

101 ou a respectiva extração de nutrientes pela espécie (Kikuti et al. 2006). Os solos da região do
102 Cerrado englobam praticamente todo o Estado de Goiás, esses possuem baixa fertilidade natural
103 devido ao material de origem e ao intemperismo (Lopes 1984). Isto exposto, somando-se ao
104 fato de que o volume de solo explorado pelo feijoeiro é baixo, boas produtividades são obtidas
105 com manejo adequado da correção, adubação e avaliação do estado nutricional da cultura (Paiva
106 Junior 2011).

107 Contudo, a diagnose nutricional para o feijoeiro com base nos teores presentes nos
108 tecidos vegetais pode ser mais eficiente quando comparado somente as análises de solo, pois as
109 concentrações dos elementos minerais encontrados correlacionam entre a absorção dos
110 nutrientes realizado pelas plantas e o manejo de adubação.

111

112 2.2 Análise foliar: método de diagnose do estado nutricional das culturas

113 Com o crescente interesse de otimizar a produção vegetal pelos produtores, visando não
114 somente o ambiente como também a rentabilidade financeira, a nutrição das plantas pode estar
115 alinhada diretamente ao aumento na produtividade das culturas. Constitui uma ferramenta onde
116 é possível monitorar o fornecimento dos nutrientes e a estratificação feita pelas plantas com as
117 adubações realizadas na lavoura. Com base nos principais métodos de diagnose nutricional, a
118 análise foliar ganha destaque por possibilitar a quantificação dos nutrientes no período de maior
119 necessidade da planta.

120 A análise química foliar detecta respostas em diversas culturas, aos vários tipos de
121 manejo, possibilitando interpretar de maneira mais eficiente, as relações entre os nutrientes na
122 planta, e também interferir no sistema adotado, elevando as possibilidades de melhores
123 resultados produtivos (Farnezi et al. 2010). Quando usada corretamente, a análise foliar pode
124 ser eficaz para o planejamento e monitoramento agrícola, com vista nos projetos de correção e

125 adubação, tanto para culturas perenes como, atualmente, para as de ciclo anual (Parent 2011;
126 Dias et al. 2013).

127 A concentração foliar do nutriente utilizado como critério de diagnóstico é baseado na
128 premissa de que existe uma relação significativa entre o suprimento de nutrientes e seus
129 respectivos níveis, e que aumentos ou decréscimos nas concentrações estão relacionados a
130 produções mais altas ou mais baixas, respectivamente (Paiva Junior 2011). Segundo Rajj
131 (1991), é fácil imaginar que, sendo os nutrientes constituintes essenciais das plantas, deve
132 existir relação entre seus conteúdos e o desenvolvimento vegetal.

133 As folhas são utilizadas para realização das análises foliares pois são órgãos de grande
134 atividade química, constituindo um instrumento eficiente para detectar desequilíbrios
135 nutricionais (Malavolta 1992; Teixeira, et al. 2007). A diagnose foliar exige maior rigor na
136 amostragem do que é realizado normalmente para solo, devido principalmente às classes de
137 fertilidade do solo admitirem variações que as vezes ultrapassam 100% com fins de adubação.
138 Como a composição de diferentes partes das plantas difere e também o estágio de crescimento
139 influi na concentração de nutrientes, com isso, há uma maior necessidade de padronização na
140 amostragem (Malavolta et al. 1997).

141 A amostragem foliar constitui-se em um processo importante, podendo acarretar erros
142 na interpretação dos resultados analíticos e na identificação das limitações nutricionais. Em
143 geral, é a etapa em que ocorrem falhas com maior frequência. Para garantir resultados que
144 reflitam o estado nutricional da cultura, a amostra coletada deve ser representativa da
145 população, possibilitando assim, melhor interpretação. Durante essa fase, devem ser observadas
146 as instruções específicas da parte da planta a ser coletada, o estágio de desenvolvimento e a
147 quantidade de material a ser coletado, uma vez que os resultados obtidos pela análise química
148 serão comparados com valores padrões estabelecidos (valores críticos ou faixas de suficiência),
149 para então serem interpretados (Osaki 1991; Malavolta et al. 1997; Carmo et al. 1998).

150 De acordo com Malavolta et al. (1997) para avaliação dos teores foliares de plantas de
151 feijão, devem ser coletadas 30 folhas por área uniforme de 1 a 50 ha. A folha deve ser a primeira
152 folha totalmente desenvolvida a partir dos folíolos superiores, estando a cultura no estágio
153 fenológico caracterizado como R5 (início de floração). Após realização da amostragem, a
154 análise química das folhas é feita em duas etapas, sendo a primeira a moagem do material após
155 lavagem em água destilada e seco a 65°C em estufa por um período de 48 horas. Posteriormente
156 realiza-se a pesagem das amostras homogeneizadas (Raij 1991). Já a segunda etapa é a
157 destruição da matéria orgânica para liberação dos nutrientes minerais, podendo ser feito por via
158 úmida, utilizando combinações de ácido nítrico, perclórico ou sulfúrico, ou por incineração do
159 material em mufla e posteriormente dissolver em ácido clorídrico. Em seguida obtêm-se
160 extratos que visam a determinação de teores totais de nutrientes (Raij 1991). É recomendado
161 que as análises sejam feitas regularmente para cada cultura, pois constitui em um panorama
162 momentâneo da situação nutricional das plantas presentes na lavoura.

163

164 2.3 Interpretação das análises foliar

165 Baseada na interpretação de resultados de análise foliar, a avaliação do estado
166 nutricional de espécies vegetais tem sido amplamente utilizada e discutida, com o intuito de
167 possibilitar intervenções mais precisas em sistemas de produção vegetal, por meio das práticas
168 de manejo e adubação (URANO et al. 2006).

169

170 2.3.1 Método das faixas de suficiência (FS)

171 Os resultados de análises químicas de plantas são interpretados por diversos métodos.
172 Tradicionalmente, utiliza-se o nível crítico ou as faixas de suficiência, os quais possuem valores
173 definidos na literatura (Camacho et al. 2012). De acordo com Serra et al. (2010), esses são, pela
174 praticidade na interpretação e por possibilitar informações claras em relação à tomada de

175 decisão da recomendação nutricional, os mais difundidos como métodos de interpretação. Os
176 métodos consideram cada elemento contido na amostra de forma univariada (Nível crítico e
177 faixas de suficiência) sem levar em consideração as relações e as interações entre os nutrientes.

178 Na cultura do feijoeiro, a interpretação da análise química foliar e a avaliação do estado
179 nutricional das plantas são realizadas, principalmente, pelos métodos do Nível Crítico Foliar
180 (NC) e Faixa de Suficiência (FS) (Partelli et al. 2014)

181 Quando comparado o método de faixas de suficiência com o nível crítico, faixa de
182 suficiência apresenta uma vantagem adicional, pois considera um intervalo entre valores
183 adequados e não um valor pontual (Camacho et al. 2012). Dessa forma, FS consiste em avaliar
184 o limite mínimo e máximo de um determinado nutriente, onde abaixo desses valores a planta
185 apresenta deficiência, acima desta apresenta consumo em luxo ou mesmo toxidez e os valores
186 da faixa estariam em níveis adequados (Faquim 2002).

187 O método de faixas de suficiência (Macy 1936) tem sido o mais amplamente adotado
188 para a interpretação do estado nutricional da cultura, dada à facilidade de sua interpretação
189 (Wadt et al. 2013).

190 Entretanto apresenta como desvantagem poucas categorias de diagnóstico, indefinição
191 quanto à severidade da deficiência, aguda ou não, e indefinição do nutriente quanto a sua ordem
192 de limitação.

193

194 2.3.2 Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação (DRIS)

195 Com o avanço da agricultura as normas referenciais para interpretação dos resultados
196 das análises química foliar, estão sendo atualizadas em nível mais regionalizado de forma a
197 permitir um avanço no aprimoramento do acompanhamento nutricional das lavouras e das
198 recomendações de fertilizantes (Rocha et al. 2007).

199 Entre os métodos de interpretação dos resultados das análises químicas foliares, o
200 Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação (DRIS) tem lugar de destaque, pois o método
201 é baseado em um índice gerado para cada nutriente, o qual permite determinar a disponibilidade
202 relativa de cada nutriente. Esse índice é obtido comparando-se as relações na forma de
203 quociente entre um nutriente e cada um dos demais presentes na amostra sob diagnose,
204 comparando esse valor com valores de referência envolvendo as mesmas relações em
205 populações sadias e produtivas, denominada de população de referência (Castamann et al.
206 2012).

207 O DRIS, além de ferramenta para diagnóstico, possibilita estimar o nível crítico no
208 tecido foliar para cada nutriente em condições de equilíbrio nutricional a partir de um banco de
209 dados coletados em campo, como demonstraram Needham et al. (1990).

210

211 2.3.2.1 Normas DRIS

212 Para execução do sistema é necessária coleta de uma quantidade significativa de
213 amostras foliares para formação dos bancos de dados, a fim de que sejam estabelecidas normas
214 ou padrões. As normas são valores médios de teores de nutrientes e das relações desses
215 nutrientes, com as respectivas variâncias, para um grande número de casos, representando
216 culturas em boas condições nutricionais (Beaufils 1971, 1973; Walworth & Sumner 1987;
217 Malavolta et al. 1989; Raji 1991). É necessária a particularização da população de referência
218 quanto as condições edafo-climáticas, material genético, época de amostragem, parte da planta
219 amostrada etc. (Beaufils 1973). Quando as relações entre nutrientes são comparadas entre si e
220 com as normas, determinam se os nutrientes estão deficientes, adequados ou em níveis de
221 consumo de luxo (Malavolta 2006).

222 O cálculo dos índices DRIS depende, inicialmente, do estabelecimento de valores
223 padrão ou normas de referência. Para isto, é necessário selecionar uma população de alta

224 produtividade (população de referência), partindo-se da premissa de que existe relação
225 significativa entre o suprimento de nutrientes e seus teores na planta, de modo que aumentos
226 ou decréscimos em suas concentrações proporcionam variação na produção (Nachtigall;
227 Dechen 2010).

228 A média, o desvio padrão e o coeficiente de variação de cada subgrupo são calculados
229 para todas as relações de nutrientes possíveis (Beaufils 1971, 1973). Segundo Reis Júnior
230 (1999), a escolha da forma de expressão da relação entre dois nutrientes (ex: N/P ou P/N) ao
231 utilizar DRIS é objeto de várias discussões. Apenas um tipo de expressão é utilizado para
232 relacionar cada par de nutrientes. O critério mais utilizado tem sido o da maior relação de
233 variâncias entre a população de baixa e de alta produtividade, este critério foi chamado de
234 “Fator F” (Letzsch 1985; Walworth & Summer 1987; Nick 1998). Malavolta et al. (1997) e
235 Raij (1991) também recomendam para uso no método aquelas relações que apresentam maior
236 quociente entre as variâncias das populações de alta e baixa produtividade. Dessa forma, é
237 possível ter maior capacidade de diferenciar amostras de lavouras nutricionalmente
238 equilibradas daquelas desequilibradas (Wadt 1996).

239

240 2.3.2.2 Cálculo e interpretação dos índices

241 No cálculo do índice, as relações normais reduzidas têm valores positivos, se o nutriente
242 estiver no numerador, negativos, se estiver no denominador, e zero, na ausência deste (Rezende
243 2014). Segundo Beaufils (1973), as relações diretas ou inversas entre dois nutrientes a serem
244 empregadas no cálculo do índice são as que apresentam maior relação de variância entre os dois
245 subgrupos (variância do subgrupo de baixa produtividade, sob variância do subgrupo de alta
246 produtividade). No cálculo das funções reduzidas impõe restrições quando a relação na amostra
247 é maior ou menor que a relação média da população. Em ambas as situações, são calculadas os
248 valores reduzidos pela fórmula Z, conforme Beaufils (1971;1973) e Oliveira (1998).

249 Quando encontrado índice DRIS negativo de um nutriente indica que o somatório da
250 relação deste nutriente com todos os demais, comparados com as mesmas relações do padrão,
251 apresenta desvio residual negativo e, portanto, este nutriente pode estar deficiente. Por outro
252 lado, quando o índice DRIS de um nutriente é positivo, indica que o somatório da relação deste
253 com todos os demais, comparados com as mesmas relações do padrão, apresenta desvio residual
254 positivo e, dessa forma, este pode estar em excesso. Assim, quanto mais próximo de zero for o
255 índice, melhor será o equilíbrio nutricional relativo ao nutriente.

256 O método DRIS é o principal método bivariado utilizado (Serra et al. 2010), tem como
257 padrão nutricional uma população de referência, estabelecida com base em plantas de alta
258 produtividade, obtendo-se o índice de balanço nutricional (IBN), que consiste na soma de
259 valores absolutos dos índices DRIS de cada nutriente, os quais indicam o estado nutricional de
260 cada área analisada (Beaufils 1973). A soma modular dos índices DRIS define o IBN (Índice
261 de Balanço Nutricional), que estima o equilíbrio nutricional da lavoura. Quanto menor o IBN,
262 melhor o equilíbrio nutricional (Costa 1999).

263 Desde sua concepção em 1973, DRIS tem sido destacadamente voltado para diagnose,
264 e minimamente para recomendação. O que se viu desde então foi o refinamento de um poderoso
265 sistema de diagnose e certo descaso com a recomendação. Entretanto, Wadt (1996) apresentou
266 o critério de Potencial de Resposta a Adubação (PRA) para contemplar essa falha. Este método
267 compara o valor modular do índice DRIS de cada nutriente com o IBN médio, como forma de
268 confrontar o desequilíbrio atribuído a um nutriente com o proporcionado pela média dos
269 nutrientes.

270

271 3 REFERÊNCIAS

272 ANGIOI, S.A. et al. Beans in Europe: origin and structure of the European landraces of
273 *Phaseolus vulgaris* L. *Theoretical and Applied Genetics*, v.121, p.829-843, 2010.

274 BEAUFILS, E. R. *Diagnosis and Recommendation Integrated System (DRIS). A general*
275 *scheme for experimentation and calibration based on principles developed from research in*
276 *plant nutrition*. University of Natal: Soil Science. 1973. 132 p.

277 BEAUFILS, E. R. Physiological diagnosis: a guide for improving maize production based on
278 principles developed for rubber trees. *Fertilizer Society of South African Journal*, v. 1, n. 1, p.
279 1-30, 1971.

280 CAMACHO, M. A. et al. Faixas normais de nutrientes pelos métodos ChM, DRIS e CND e
281 nível crítico pelo método de distribuição normal reduzida para laranjeira-pera. *Revista*
282 *Brasileira de Ciências do Solo*, 2012. 46 v. 193-200 p.

283 CAMPOS, T et al. Inheritance of growth habit detected by genetic linkage analysis using
284 microsatellites in the common bean (*Phaseolus vulgaris* L.). *Molecular Breeding*, v. 27, p. 549-
285 560, 2011.

286 CARMO, C. A. F. S. et al. Tecidos vegetais. In: NOGUEIRA, A. R. A.; MACHADO, P. L. O.;
287 CARMO, C. A. F. S. do; FERREIRA, J. R. (Ed.) *Manual de laboratórios: solo, água, nutrição*
288 *vegetal, nutrição animal e alimentos. 1. Coleta, acondicionamento e preparo de amostras*.
289 EMBRAPA - Centro de Pesquisa de Pecuária do Sudeste, 1998. 32-42 p.

290 CARNEIRO, J. E. S. Alternativas para obtenção e escolha de populações segregantes no
291 feijoeiro. *Curso de Pós Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, Universidade*
292 *Federal de Lavras (UFV)*, Tese (Doutorado em Agronomia), 134 f, 2002.

293 CASTAMANN, A. et al. Diagnosis and recommendation integrated system (DRIS) of soybean
294 oil content. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, 2012. 36 v. 1820-1827 p.

295 CONAB | Acompanhamento da safra brasileira de grãos | v. 4 - Safra 2016/17, n.12 - Décimo
296 segundo levantamento, setembro 2017. Disponível em:
297 <https://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_09_12_09_01_56_boletim_graos
298 [_setembro_2017.pdf](https://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_09_12_09_01_56_boletim_graos_setembro_2017.pdf)>. Acesso em: 29 nov. 2017.

299 CONAB | Acompanhamento da safra brasileira de grãos | v. 5 - Safra 2017/18, n.5 - Quinto
300 segundo levantamento, fevereiro 2018. Disponível em:
301 <http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/18_02_08_17_09_36_fevereiro_2018
302 .pdf>. Acesso em: 20 fev. 2018.

303 COSTA, A. N. Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação (DRIS). In: DRIS: *Um aliado*
304 *no diagnostico nutricional de plantas*, 24., 1999, Viçosa. Boletim Informativo... Viçosa: SBCS,
305 1999. 13-15 p.

306 CRESTE, J. E.; ECHER, F. R. Establishing standards for the integrated recommendation and
307 diagnosis system (DRIS) for irrigated bean crops. *Commun. Soil Science and Plant Analysis*,
308 v. 41, n. 16, p. 1921-1933, 2010.

309 DIAS, J. R. M. et al. Normas DRIS multivariadas para avaliação do estado nutricional de
310 laranjeira ‘Pera’ no estado do Amazonas. *Revista Ciência Agronômica*, 2013. 44 v. 251-259 p.

311 FAQUIM, V. *Diagnose do Estado Nutricional das plantas*. Ed. UFLA/FAEPE, 2002.77 p.

312 FARNEZI, M. M. M. et al. Levantamento da qualidade da bebida do café e avaliação do estado
313 nutricional dos cafeeiros do Alto Jequitinhonha, Minas Gerais, através do DRIS. *Ciência e*
314 *Agrotecnologia*, 2010. 34 v. 1191- 1198 p.

315 GUIMARÃES, P. T. G. et al. Faixas críticas de concentrações de nutrientes e avaliação do
316 estado nutricional de cafeeiros em quatro regiões de Minas Gerais. *Pesquisa Agropecuária*
317 *Brasileira*, 2003. 38 v. 6 n. 703-713 p.

318 KIKUTI, et al. Terores de macronutrientes na parte aérea do feijoeiro em função de doses de
319 nitrogênio e fósforo. *Bragantia*, 2006. 65 v. 2 n.347-354 p.

320 KURIHARA, C. H. et al. Interpretação de resultados de análise foliar. *Documentos 74*.
321 Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Florestas, p. 42, 2005.

322 LETZSCH, W.S. Computer program for selection of norms for use in the diagnosis and
323 recommendation integrated system (DRIS). *Communications in Soil Science and Plant*
324 *Analysis*, 1985. 16 v. 339-347 p.

325 LOPES, A. S. *Solos sob “cerrado”*: Características, propriedades e manejo. Associação
326 Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fosfato. 2ªEd. 1984.

327 MACY, P. The quantitative mineral nutrient requirements of plants. *Plant Physiology*, 1936.
328 11 v. 4 n. 749-764 p.

329 MALAVOLTA, E. *ABC da análise de solos e folhas*. Ceres, 1992. 124p.

330 MALAVOLTA, E. et al. *Avaliação do estado nutricional das plantas, princípios e aplicações*.
331 2ª ED. POTAFOS, p. 319, 1997.

332 MALAVOLTA, E. et al. *Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações*.
333 POTAFOS, 1997. 201 p.

334 MALAVOLTA, E. et al. *Avaliação do estado nutricional das plantas; princípios e aplicações*.
335 Potafos, 1989. 201 p.

336 MALAVOLTA, E. *Manual de nutrição mineral de plantas*. Agronômica Ceres, p. 638, 2006.

337 MESQUITA, M. A. M. Estado nutricional e normas DRIS para o feijoeiro irrigado em
338 Cristalina, Goiás. *Escola de Agronomia – Universidade Federal de Goiás*. Tese de Doutorado
339 em Agronomia, f. 105, 2013.

340 MESQUITA, R. F. et al. Linhagens de feijão (*Phaseolus vulgaris* L.): Composição química e
341 digestibilidade protéica. *Ciência e Agrotecnologia*, v.31, n.2, p.1114-1121, 2007.

342 MOURÃO FILHO, F. A. A. et al. Função e ordem da razão dos nutrientes no estabelecimento
343 de normas DRIS em laranjeira ‘Valência’. *Pesquisa agropecuária brasileira*, v. 37, n. 2, p. 185-
344 192, 2002.

345 NACHTIGALL, G. R.; DECHEN, A. R. DRIS como método diagnóstico de nutrição mineral
346 de plantas. In: PRADO, R. M.; CECÍLIO FILHO, A. B.; CORREIA, M. A. R.; PUGA, A. P.
347 *Nutrição de plantas: diagnose foliar em hortaliças*, 2010. 185-198 p.

348 NASSAR, R. M. A. et al. Botanical studies on Phaseolus vulgaris L. I-Morphology of
349 Vegetative and Reproductive Growth. *International Journal of Bonaty*, v. 6, p. 323-333, 2010a.

350 NEEDHAM, T. D. et al. Relationship between diagnosis and recommendation integrated
351 system (DRIS) optima and foliar nutrient critical levels. *Soil Science Society of America*
352 *Journal*, 1990. 54 v. 883-886 p.

353 NICK, J. A. *DRIS para cafeeiros podados*. USP/ESALQ, 1998. Dissertação – Mestrado, 86 f..

354 OLIVEIRA, S. A. Avaliação do balanço nutricional no sistema solo - planta pelo DRIS. In:
355 *Simposio sobre fertilidade do solo em plantio direto*, 1997. EMBRAPA-CPAO (Documentos,
356 22). 1998. 81-87 p.

357 OSAKI, F. *Calagem e adubação*. 2ª Ed. Instituto Brasileiro de Ensino Agrícola, 1991. 503 p.

358 PAIVA JÚNIOR, E. F. *Padrões foliares e de solo para a cultura do feijoeiro comum no vale*
359 *do Rio dos Bois, Goiás*. Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal
360 de Goiás. Dissertação (Mestrado em Agronomia) 2011.79 p.

361 PAPA, R. et al. The evolution of genetic diversity in Phaseolus vulgaris L. In: MOTLEY, T.J.
362 *Darwin's harvest : new approaches to the origins, evolution, and conservation of crop*. p.121-
363 142, 2004.

364 PARENT, L. E. Diagnosis of the nutrient compositional space of fruit crops. *Revista Brasileira*
365 *de Fruticultura*, 2011. 33v. 321-334 p.

366 PARTELLI, F. L. et al. Avaliação nutricional de feijoeiro irrigado pelos métodos CND, DRIS
367 e faixas de suficiência. *Revista Brasileira de Ciência do solo*, 2014. 38 v. 3 n. 858-866 p.

368 RAIJ, B. V. *Fertilidade do solo e adubação*. Editora Agronômica Ceres, 1991. 343 p.

369 RAMOS JUNIOR, E. U. et al. Componentes da produção, produtividade de grãos e
370 características tecnológicas de cultivares de feijão. *Bragantia*, v. 64, n. 1, p. 75-82, 2005.

371 REIS JUNIOR, R. A. *Diagnose nutricional da cana-de-açúcar com o uso do Sistema Integrado*
372 *de Diagnose e Recomendação (DRIS)*. Universidade Estadual do Norte Fluminense, 1999.
373 141p. (Tese de Doutorado)

374 REZENDE, C. F. A. *Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação (DRIS) em produção de*
375 *mudas de citrus*. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Goiás, Escola de Agronomia,
376 2014.

377 ROCHA, A. C. et al. Normas DRIS para cultura do milho semeado em espaçamento reduzido
378 na região de Hidrolândia, GO, Brasil. *Bioscience Journal*, 2007. 23 v. 50-60 p.

379 ROSOLEM, C. A. Calagem e adubação mineral. In: ARAUJO, R. S., RAVA, C. A., STONE,
380 L. F., ZIMMERMANN, M. J. O. (Coord.). *Cultura do feijoeiro comum no Brasil. Potafos*,
381 1996, 353-385p.

382 ROSOLEM, C.A.; MARUBAYASHI, O.M. Seja o doutor do seu feijoeiro. *Encarte do*
383 *Informações Agronômicas*. 1994, .68n., 16p.

384 SANTOS, J. B.; GAVILANNES, M. L. Botânica. In: Vieira, C.; Paula Júnior, T. J.; Borém, A.
385 (Ed.). *Feijão*. 2.Ed. p. 41-65, 2006.

386 SERRA, A. P. et al. Desenvolvimento de normas DRIS e CND e avaliação do estado nutricional
387 da cultura do algodoeiro. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, 2010. 34 v. 97-104 p.

388 SINGH, B. B. Sixty-day cowpea varieties. *Agronomy Abstracts*, p.83, 1982.

389 SOUZA, D. M. G.; LOBATO, E. *Cerrado: Correção do solo e adubação*. 2ª Ed. Embrapa
390 Informações Tecnológicas, p. 416, 2004.

391 SOUZA, R. F. Sistema integrado de diagnose e recomendação (DRIS) para a cultura da soja
392 convencional e transgênica na região sudeste de Goiás. 2013. *Universidade Federal de*
393 *Goiás*,119 f. Tese (Doutorado em Agronomia), 2013.

394 TEIXEIRA, L. A. J. et al. Avaliação do estado nutricional de bananeiras do subgrupo Cavendish
395 no estado de São Paulo: normas DRIS e níveis críticos de nutrientes. *Revista Brasileira de*
396 *Fruticultura*, 2007. 29v. 3 n. 613-620 p.

397 URANO, E. O. M. Avaliação do estado nutricional da soja. *Pesquisa agropecuária brasileira*,
398 2006. 41 v. 9 n. 1421-1428 p.

399 VIEIRA, S. R. et al. Variabilidade espacial dos teores foliares de nutrientes e da produtividade
400 da soja em dois anos de cultivo em um latossolo vermelho. *Revista Brasileira Científica do*
401 *Solo*, v. 34, n. 5, p. 1503-1514, 2010.

402 WADT, P. G. S. et al. Padrões nutricionais para lavouras arrozeiras irrigadas por inundação
403 pelos métodos da CND e Chance Matemática. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, 2013. 37
404 v. 145-156 p.

405 WADT, P. G. S. *Os métodos da chance matemática e do Sistema Integrado de Diagnose e*
406 *Recomendação (DRIS) na avaliação nutricional de plantios de eucalipto*. Universidade Federal
407 de Viçosa, 1996. Tese (Doutorado em Agronomia: Solos e Nutrição de Plantas). 23 f.

408 WALWORTH, J. L.; SUMNER, M. E. The diagnosis and recommendation system (DRIS).
409 *Adv. Soil Science*, 1987. 6 v. 149-188 p.

410 ZIMMERMANN, M. J. O.; TEIXEIRA, M. G. Origem e Evolução. In: ARAUJO, R.S.; RAVA,
411 C.A.; STONE, L.F.; ZIMMERMANN, M.J.O. (Coord.). *Cultura do feijoeiro comum no Brasil*.
412 *Piracicaba: Potafos*, 1996, 57-68p.

413

414

415

416

417

418 CAPITULO 01 – DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL FOLIAR DO FEIJÃO PRIMEIRA
419 SAFRA, NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU, GO, UTILIZANDO O MÉTODO DAS
420 FAIXAS DE SUFICIÊNCIA.

421 RESUMO

422 A avaliação nutricional pela análise foliar possibilita verificar a capacidade da cultura
423 de absorver os nutrientes, permitindo, com isso, diagnosticar os fatores nutricionais limitantes
424 para a produção. Dessa forma, o feijoeiro que apresenta ciclo reduzido e sistema radicular
425 predominante nas camadas superficiais do solo, pode ser beneficiado por esse diagnóstico,
426 tornando-se uma importante ferramenta para os demais ciclos de cultivo, com informações
427 estritamente locais. Assim, o objetivo do trabalho foi diagnosticar os nutrientes e interações
428 mais limitantes no feijoeiro pela metodologia das faixas de suficiência. O experimento foi
429 conduzido no município de Montividiu-GO, utilizando a cultivar BRSMG Madrepérola com
430 semeadura no início de outubro. Totalizou 49 amostragens, uma amostra composta era formada
431 por 30 subamostras, retirando a primeira folha totalmente expandida na época do florescimento.
432 Na interpretação dos resultados foliares pelo método de faixas de suficiência, os valores foram
433 submetidos a teste de estatística univariada, distribuição de frequência e correlação linear de
434 Pearson entre os teores de nutrientes. Constatou que o enxofre é o elemento com menor
435 absorção no feijoeiro, com 98% das amostras enquadrando como deficiente para a cultura. Os
436 nutrientes, fosforo, potássio e manganês, em 100% das amostras foram classificados em
437 excesso. Verificou-se que nitrogênio, cálcio e zinco se encontravam em excesso, em 51%,
438 85,7% e 98% das amostras, respectivamente. Conclui-se que a metodologia das faixas de
439 suficiência é eficiente para interpretação dos resultados foliares com o interesse de adequação
440 no manejo nutricional da cultura do feijão.

441

442 Palavras-chave: *Phaseolus vulgaris*, dris, análise foliar.

443 CHAPTER 01 - NUTRITIONAL FOLIAR DIAGNOSIS OF THE FIRST SAFRA
444 BEAN, IN THE MUNICIPALITY OF MONTIVIDIU, GO, USING THE SUFFICIENCY
445 METHOD.

446

447 ABSTRACT

448 The nutritional evaluation by foliar analysis makes it possible to verify the ability of the
449 crop to absorb nutrients, thus allowing the diagnosis of the nutritional limiting factors for the
450 production. Thus, bean plants that present reduced cycle and predominant root system in the
451 superficial layers of the soil, can be benefited by this diagnosis, becoming an important tool for
452 the other crop cycles, with strictly local information. Thus, the objective of this work was to
453 diagnose the most limiting nutrients and interactions in common bean by the methodology of
454 the ranges of sufficiency. The experiment was conducted in the municipality of Montividiu-
455 GO, using the cultivar BRSMG Madrepérola with sowing at the beginning of October. A total
456 of 49 samples were taken, a composite sample consisting of 30 subsamples, removing the first
457 fully expanded leaf at the time of flowering. In the interpretation of the foliar results by the
458 method of sufficiency ranges, the values were submitted to univariate statistical test, frequency
459 distribution and linear correlation of Pearson among the contents of nutrients. It was verified
460 that sulfur is the element with lower absorption in the bean, with 98% of the samples being
461 classified as deficient for the culture. The nutrients, phosphorus, potassium and manganese in
462 100% of the samples were classified in excess. Nitrogen, calcium and zinc were found to be in
463 excess in 51%, 85.7% and 98% of the samples, respectively. It was concluded that the
464 methodology of the ranges of sufficiency is efficient for interpretation of the foliar results with
465 the interest of adequation in the nutritional management of the bean culture.

466

467 Keywords: *Phaseolus vulgaris*, dris, leaf analysis

468 1. INTRODUÇÃO

469 A cultura do feijão comum (*Phaseolus vulgaris* L.) é amplamente difundida no Brasil,
470 podendo ser distribuída em três períodos, primeira safra (das águas), segunda safra (da seca) e
471 terceira safra (de inverno), encontrada principalmente em produtores com alta tecnologia
472 obrigatoriamente à irrigação, caracterizando o Brasil como terceiro maior produtor mundial,
473 atrás de Myanmar e Índia (Conab 2017). Na safra 2016/17 o Brasil atingiu uma produção total
474 de 3,2 milhões de toneladas, sendo que o Centro-Oeste contribuiu com 14,9% deste valor, tendo
475 o estado de Goiás com a maior produtividade brasileira, 2.507 kg ha⁻¹ (Conab 2018).

476 O aumento da produtividade do feijoeiro está intimamente relacionado a nutrição
477 mineral ofertada a planta, sendo a exigência nutricional da cultura alta, justificado pelo sistema
478 radicular pouco desenvolvido e superficial, além do seu ciclo curto. Dessa forma, é fundamental
479 que o nutriente seja colocado à disposição da planta, em tempo e local adequados (Rosolem &
480 Marubayashi 1994). No entanto, nem sempre o manejo nutricional aplicado a cultura, resulta
481 em produtividade esperada, sendo indicado realizar uma avaliação foliar para o
482 acompanhamento da nutrição da planta. Para atingir esse nível de informação torna-se
483 fundamental a coleta adequada das folhas e sua consequente análise química.

484 A análise química das folhas fornece um panorama da nutrição da planta em um
485 determinado período de desenvolvimento da cultura, normalmente na época de maior
486 necessidade nutricional, sendo sem dúvidas, uma das melhores ferramentas para avaliar a
487 disponibilidade dos nutrientes no solo e a capacidade de absorção da planta de extrair os
488 próprios elementos químicos de forma eficiente (Vieira et al. 2010).

489 O uso da análise foliar, na diagnose do estado nutricional das plantas, tem como
490 fundamento o fato de existir uma correlação entre sua taxa de crescimento ou de produção e o
491 teor de nutrientes nos seus tecidos. Muitos fatores como cultivar, idade fisiológica e parte da
492 planta a ser amostrada, podem interferir na composição das folhas. Contudo, anteriormente a

493 amostragem do material vegetal a ser analisado, é necessário que esses fatores estejam bem
494 definidos (Mesquita 2013). Com a análise química foliar disponibilizada para as devidas
495 avaliações, pode-se optar por uma metodologia de interpretação capaz de atender as
496 necessidades locais de informações sobre a nutrição da cultura.

497 Os métodos mais usuais para interpretação de análises químicas em folhas pressupõem
498 a comparação das concentrações de nutrientes encontradas, com valores de referência (Mourão
499 Filho et al. 2002). Quando o valor padrão corresponde ao teor do nutriente a partir do qual o
500 nível produtivo da cultura será igual ou maior que 90% da produtividade máxima, denomina-
501 se de nível crítico (NC) ou faixas de suficiência (FS) (Kurihara et al. 2005).

502 Na cultura do feijoeiro, a interpretação das análises foliares e a avaliação do estado
503 nutricional das plantas são realizadas, principalmente, pelos métodos do Nível Crítico Foliar
504 (NC) e Faixa de Suficiência (FS). Essas técnicas apresentam facilidade na interpretação dos
505 resultados analíticos, como também disponibilidade de valores padrões nutricionais na
506 literatura especializada (Souza & Lobato, 2004; Creste & Echer 2010).

507 Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar o estado nutricional do feijoeiro, safra
508 2016/17 no município de Montividiu, GO, por meio das concentrações de nutrientes
509 determinadas por análise foliar e interpretadas pelo método das faixas de suficiência.

510

511 2. MATERIAL E MÉTODOS

512 O trabalho foi desenvolvido entre outubro de 2016 e janeiro de 2017, na fazenda Bom
513 Jardim, localizado no município de Montividiu (17°16'57"S e 51°19'41"O), região sudoeste
514 goiano, com a cultura do feijão comum, cultivar BRSMG Madrepérola, feijão carioca com
515 tegumento claro e longa duração de armazenamento, sem alterar a coloração. Segundo Koppen
516 (1948), o clima da região é caracterizado por duas estações bem definidas: uma chuvosa e
517 quente (outubro a abril) e outra fria e seca (maio a setembro).

518 A cultura do feijão foi implantada dentro do sistema de rotação em plantio direto,
519 posteriormente ao algodão safrinha. A semeadura ocorreu entre os dias 01 e 06 de outubro de
520 2016, com população de 211.111 mil plantas por hectare, no espaçamento de 0,45m entre linhas
521 de semeadura.

522 Devido a rotação de cultura e com base na análise de solo, não houve adubação de
523 plantio na cultura do feijão, considerando que a cultura anterior, no caso o algodão, forneceria
524 os nutrientes necessários para o desenvolvimento inicial do feijoeiro. Sendo assim, o manejo
525 de adubação utilizado no algodão foi de 150 kg ha⁻¹ de MAP no plantio, 180 kg ha⁻¹ de KCl no
526 estágio V3 e 450 kg ha⁻¹ de ureia parcelado em três aplicações proporcionais de 150 kg no
527 estágio vegetativo até o primeiro botão floral. Houve também manejo nutricional de
528 micronutrientes, onde foi aplicado, via foliar: 28 g ha⁻¹ de cobre, 230 g ha⁻¹ de manganês, 391
529 g ha⁻¹ de boro e 63 g ha⁻¹ de zinco.

530 Para o manejo de adubação, antecipando o plantio, realizou a lanço 280 kg ha⁻¹ de
531 superfosfato simples (18% P₂O₅; 18-20% Ca; 11-12% S). Na adubação em cobertura, utilizou
532 250 kg ha⁻¹ do formulado 45-00-00, sendo a primeira aplicação na dose de 150 kg ha⁻¹ no estágio
533 V2 e a segunda com 100 kg ha⁻¹ no estágio V4. No período de floração, foi realizada uma
534 aplicação de manganês, com fornecimento de 26g ha⁻¹ do nutriente.

535 Foram estabelecidas 7 glebas para amostragem das folhas do feijão com o objetivo de
536 diagnosticar o estado nutricional, a definição de glebas partiu do preceito de que as áreas
537 apresentavam homogeneidade do solo, palhada e desenvolvimento do feijoeiro. Em cada gleba
538 foram coletadas 7 amostras compostas, totalizando 49 pontos de amostragem com marcação
539 das coordenadas geográficas e altitude, para facilitar a localização no momento de colheita.

540 Cada amostra foliar composta foi formada por 30 subamostras coletadas de forma
541 aleatória, sendo o caminhamento entre as amostras realizado em ziguezague. As amostragens
542 foram coletadas no período do florescimento, retirando a primeira folha totalmente expandida

543 a partir dos folíolos superiores. Após a coleta, as folhas foram colocadas em saco de papel com
544 identificação e encaminhadas para o laboratório, para análises dos teores totais de nitrogênio,
545 fosforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês e zinco.

546 A colheita mecanizada iniciou no dia 27 de dezembro de 2016, no mesmo realizou a
547 amostragem de produtividade manual, em cada ponto amostral foram coletadas 3 metros
548 lineares de plantas de feijão, composta por 3 subamostras de 1 metro. Essas plantas foram
549 arrancadas e armazenadas em sacos plásticos para transporte até o local de secagem, as amostras
550 foram distribuídas individualmente em ambiente aberto para diminuição da umidade para
551 realização da trilha manual, posteriormente foram pesadas e determinadas a umidade por meio
552 do medidor de umidade de grãos, com finalidade de estimar produtividade em cada ponto
553 amostral.

554 Foi aplicado teste de estatística univariada, sendo calculadas as médias, desvio padrão,
555 coeficientes de variação e valores máximos e mínimos. Utilizou-se a análise de correlação linear
556 simples, Correlação Linear de Pearson, para verificar a relação entre os teores de nutrientes nas
557 folhas, a 5 e 1%, pelo teste de t.

558 Para interpretação dos resultados das análises foliares foram utilizadas as concentrações
559 adequadas para a cultura do feijão, aplicando a metodologia das faixas de suficiência, conforme
560 Tabela 1 (Malavolta et al. 1997; Ambrosano et al. 1996).

561
562 Tabela 1. Classes de interpretação para os nutrientes N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn, Zn, B, Co
563 e Mo, obtidos pela análise foliar do feijoeiro, pela faixas de suficiência.

N ¹	P ¹	K ¹	Ca ¹	Mg ¹	S ¹	B ²	Cu ²	Fe ²	Mn ²	Zn ²
g kg ⁻¹					mg kg ⁻¹					
30-50	2-3	20-25	15-20	4-7	5-10	30-60	10-20	100-450	30-300	20-100

564 ¹Malavolta et al. (1997); ²Ambrosano et al. (1996).

565 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

566 Os valores médios encontrados no experimento foram submetidos à avaliação do estado
567 nutricional pela metodologia de faixa de suficiência com base na literatura, Malavolta et al.
568 (1997) e Ambrosano et al. (1996) (Tabela 3). Os teores médios obtidos nas amostras de folha
569 (Tabela 4) foram comparados de tal modo que foi possível verificar que apenas quatro dos onze
570 nutrientes analisados encontram-se na classe adequado, são eles: Mg, B, Cu e Fe. Já os
571 nutrientes: N (51,59 g kg⁻¹), P (4,63 g kg⁻¹), K (50,93 g kg⁻¹), Ca (23,78 g kg⁻¹), Mn (386,13 g
572 kg⁻¹) e Zn (133,53 g kg⁻¹) se apresentam em excesso no feijoeiro. Apenas o enxofre, com valor
573 de 3,55 g kg⁻¹, foi classificado como deficiente.

574 Utilizando os valores da mediana para interpretação dos resultados conforme as faixas
575 estabelecidas (Tabela 1), verificaram-se valores próximos à média, o que indica uma
576 distribuição com poucas variações entre as amostras. Sendo assim, os nutrientes enquadraram-
577 se semelhantemente as médias.

578 Outro modo de medir a dispersão dos resultados é pela amplitude total, que leva em
579 consideração o valor mínimo e máximo de cada nutriente (Tabela 2). Dessa forma, os nutrientes
580 P, K, Mn e Zn não apresentaram alteração de classe quando avaliado o valor mínimo e máximo,
581 ambos se encontram em excesso na planta. O micronutriente Fe também não apresentou
582 alteração na classe quando avaliado a amplitude total, sendo classificado como adequado. Os
583 valores dos nutrientes N, Mg e B, enquadraram-se da seguinte forma, valor mínimo: adequado,
584 e valor máximo: excesso. Somente para o elemento Ca, o valor mínimo apresentou baixo teor,
585 enquanto o valor máximo, excesso. O S e Cu obtiveram valor mínimo e máximo classificado
586 como: deficiente e adequado, respectivamente.

587

588 Tabela 2. Valores mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação
 589 para os teores de macro e micronutrientes obtidos pela análise de folha em 49 amostras na
 590 cultura do feijão sequeiro no município de Montividiu, GO, 2017

Variável	Mínimo	Máximo	Média	Mediana	Desvio Padrão	CV(%)
N (g kg ⁻¹)	41,06	64,07	51,59	50,23	5,70	11,04
P (g kg ⁻¹)	3,44	6,35	4,63	4,53	0,64	13,75
K (g kg ⁻¹)	39,50	65,75	50,93	49,00	7,05	13,84
Ca (g kg ⁻¹)	13,50	31,50	23,78	24,50	3,20	13,47
Mg (g kg ⁻¹)	4,10	7,63	6,14	6,25	0,81	13,13
S (g kg ⁻¹)	2,64	5,10	3,55	3,49	0,47	13,21
B (g kg ⁻¹)	40,34	69,82	54,68	55,59	6,91	12,64
Cu (g kg ⁻¹)	7,50	19,00	12,07	12,50	2,73	22,62
Fe (g kg ⁻¹)	160,00	225,00	192,98	195,00	16,70	8,66
Mn (g kg ⁻¹)	346,50	436,50	386,13	381,00	24,47	6,34
Zn (g kg ⁻¹)	100,00	176,00	133,53	133,50	19,61	14,69

591
 592 Quando avalia-se separadamente cada amostra, levando em consideração aos 49 valores
 593 por elemento, é possível realizar uma distribuição de frequência para todos os nutrientes (Tabela
 594 3).

595 Sendo assim, foi encontrado que em 98% das amostras o teor de S está abaixo da faixa
 596 de suficiência, seguido do Cu, com 30,6%. O enxofre nas culturas leguminosas exerce um papel
 597 fundamental, maximizando a fixação biológica do N, tornando-se um elemento de extrema
 598 importância para o feijoeiro (Prado 2008). Entretanto, no experimento foi realizado adubação
 599 para fornecimento de nitrogênio, com isso, não houve queda no teor de N, justificando os
 600 resultados encontrados nas amostras foliares.

601 Com base nos dados abaixo (Tabela 3), verifica-se que para os nutrientes, P, K e Mn
602 100% das amostras foliares estão classificados em excesso. Segundo Marschner (1995), o
603 fósforo em altas concentrações pode induzir sintomas de deficiência de micronutrientes. Nesta
604 situação, observa-se que 24,5% das amostras estão com deficiência em Cu.

605 Nota-se que a quantidade de potássio no solo está alta, oriunda da rica adubação de
606 potássio para a cultura anterior, no caso o algodão, onde a produtividade estimada não foi
607 semelhante a produtividade final da área, acarretando disponibilidades de nutrientes já que não
608 houve absorção e exportação dos nutrientes. Segundo Leandro (1998) os produtores realizam
609 em excesso adubação de potássica, podendo em níveis elevados causar desbalanços
610 nutricionais. O excesso de K aplicado pode acarretar desbalanço entre cálcio e o magnésio,
611 contribuindo para a redução da produtividade da cultura do feijão Azuki (Mota et al. 2001;
612 Carnicelli et al. 2000) e prejuízo no desenvolvimento do sistema radicular e da parte aérea da
613 planta ocasionado pelo elevado índice salino do fertilizante (Grangeiro & Cecílio Filho 2004).

614 O excesso de Mn no feijoeiro causa mais prejuízo à simbiose do que o desenvolvimento
615 da planta em si (Dobereiner 1966). Entretanto pode aparecer inicialmente clorose marginal,
616 pontuações marrons que evoluem para necroses na superfície do limbo foliar, especialmente
617 em leguminosas (Prado 2008). Segundo Nogueira et al. (1982), em feijão de corda, houve um
618 crescimento acelerado antes do surgimento visual dos sintomas, porém, quando apareceram, as
619 plantas diminuíram sensivelmente o ritmo de crescimento, e ressaltam que as plantas não
620 produziram flores.

621 Os nutrientes Zn, Ca, e N, apresentam em excesso em mais de 50% das amostras
622 realizadas. O excesso de zinco provoca inibição da fotossíntese pela diminuição da atividade
623 da rubisco, o que acarreta a redução da concentração de clorofila a e b e de proteínas solúveis,
624 desencadeando efeitos depressivos nas variáveis de crescimento da planta e deficiências no
625 processo fotossintético (Zabini, et al. 2007, Silva et al 2010). Segundo Epstein (1975), o excesso

626 de cálcio pode inibir competitivamente o efeito ativador do Mg. Com o nitrogênio classificado
 627 como alto na planta, está relacionado com o desvio de carboidratos para as proteínas,
 628 promovendo o excesso de desenvolvimento vegetativo da parte aérea, quando comparado a fase
 629 reprodutiva, causando também aumento da relação da parte área e raiz, prejudicando o
 630 desenvolvimento do sistema radicular e diminuindo a capacidade de resistência das plantas em
 631 períodos de veranicos (Prado 2008).

632

633 Tabela 3. Distribuição de frequência dos elementos químicos: N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe,
 634 Mn e Zn, obtidos pela amostragem de folha em 49 pontos avaliados, na cultura do feijão
 635 sequeiro, no município de Montividiu, GO, 2017

Variância	Critério de interpretação (%)		
	Baixo	Adequado	Alto
N	0,0	49,0	51,0
P	0,0	0,0	100,0
K	0,0	0,0	100,0
Ca	2,0	12,2	85,7
Mg	0,0	87,8	12,2
S	98,0	2,0	0,0
B	0,0	85,7	14,3
Cu	24,5	75,5	0,0
Fe	0,0	100,0	0,0
Mn	0,0	0,0	100,0
Zn	0,0	2,0	98,0

636

637 Com base nas correlações entre os nutrientes presentes nas folhas de feijão, verificou
638 que aproximadamente 27% dos coeficientes de correlação linear entre os nutrientes foliares
639 foram significativos pelo teste t ($p < 0,05$) (Tabela 4).

640 Dentre as correlações lineares, destacam-se as positivas e altamente significativas
641 ($p < 0,01$) entre: P/K, P/Ca, P/Mg, P/Cu, Ca/Mg, Mg/Cu, S/Cu. Ressalta que mesmo com teores
642 acima do adequado, supõe que os nutrientes em questão não estão acarretando perdas ou
643 interferências na cultura do feijão. Houve também correlação positiva e significativa a 5%, para
644 as correlações entre os nutrientes: K/Fe, Ca/Cu, Mg/S, Cu/Mn.

645 Quando avaliamos as correlações negativas, fica evidente que o N pode estar
646 interferindo a praticamente todos os nutrientes, com exceção do Fe e Zn. As correlações
647 significativas a 5% são: N/Ca, N/Mg, N/S, N/B e N/Cu, sendo apenas a N/P correlação negativa
648 altamente significativa ($p < 0,01$). Uma vez que a adubação do feijoeiro foi realizada com fonte
649 em ureia, podemos vincular ao fato que, quando a planta absorve o nitrogênio, existe um efeito
650 negativo do NH_4^+ , na absorção de outros cátions, Mg^{+2} , Ca^{+2} , em função de seu efeito
651 acidificante no citosol e não somente pela competição pelos sítios de absorção (Prado 2008).
652 Na cultura do algodoeiro, também foi observado correlação negativa entre o S e N. A explicação
653 desse comportamento, é a de que em concentrações maiores de S nas folhas, as concentrações
654 de N apresentaram tendência a serem reduzidas, provavelmente em decorrência da competição
655 entre os dois elementos, durante a translocação (Neves et al. 2005). Segundo Malavolta (2006),
656 pode existir inibição competitiva entre cobre e o NH_4^+ , justificando a interação negativa e entre
657 o N e Cu.

658 Tabela 4. Correlação linear de Pearson entre os nutrientes da folha de feijão.

Variáveis	N	P	K	Ca	Mg	S	B	Cu	Fe	Mn	Zn
N	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P	-0,4302**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	-0,1916	0,4294**	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ca	-0,3322*	0,4484**	0,2573	1	-	-	-	-	-	-	-
Mg	-0,3254*	0,374**	-0,0778	0,4664**	1	-	-	-	-	-	-
S	-0,3012*	0,1342	0,0491	0,0523	0,2918*	1	-	-	-	-	-
B	-0,287*	0,258	0,1937	-0,0632	-0,1892	-0,1072	1	-	-	-	-
Cu	-0,3142*	0,4828**	0,0248	0,2955*	0,4044**	0,4943**	0,0372	1	-	-	-
Fe	0,0693	0,1033	0,3135*	-0,211	-0,2671	-0,1311	0,0616	-0,1567	1	-	-
Mn	-0,0143	-0,1106	-0,1405	0,0036	0,0701	0,0831	-0,1246	0,3132*	-0,1511	1	-
Zn	0,1001	0,0206	-0,0311	-0,0945	0,2225	0,101	-0,0797	0,2	-0,3896**	-0,0906	1

659 * e **: significativos a 5 e 1%, respectivamente, pelo teste t.

660

661 4. CONCLUSÃO

662 Conclui-se que a metodologia de faixas de suficiência utilizada foi eficaz para
663 interpretação dos resultados, uma vez que foi possível encontrar quais nutrientes estavam fora
664 da faixa, para excesso ou deficiência.

665 Atenta-se que o enxofre foi nutriente mais crítico na classe de deficiente, podendo haver
666 perdas na produtividade. Quando se avalia a classe de excesso, verifica-se que a maioria dos
667 macronutriente: nitrogênio, fósforo e potássio, estão com uma porcentagem alta das amostras
668 classificadas nesse grupo.

669 É importante utilizar outros métodos de avaliação para obter maior segurança em
670 relação aos nutrientes que mais contribuem para o desequilíbrio na planta.

671

672 5. REFERENCIAS

673 AMBROSANO, E. J.; et al. Leguminosas e Oleaginosas. In: RAIJ B. V. et al. *Recomendações*
674 *de adubação e calagem para o Estado de São Paulo*. 2.ed. Boletim 100, 1996. 189-191 p.

675 CARNICELLI, J. H. et al. Índices de nitrogênio na planta relacionados com a produção
676 comercial de cenoura. *Horticultura Brasileira*, 2000. 18 v. 808-810 p.

677 CONAB | Acompanhamento da safra brasileira de grãos | v. 4 - Safra 2016/17, n.12 - Décimo
678 segundo levantamento, setembro 2017. Disponível em:
679 <[https://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_09_12_09_01_56_boletim_graos](https://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_09_12_09_01_56_boletim_graos_setembro_2017.pdf)
680 [_setembro_2017.pdf](https://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_09_12_09_01_56_boletim_graos_setembro_2017.pdf)>. Acesso em: 29 nov. 2017.

681 CONAB | Acompanhamento da safra brasileira de grãos | v. 5 - Safra 2017/18, n.5 - Quinto
682 segundo levantamento, fevereiro 2018. Disponível em:
683 <[http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/18_02_08_17_09_36_fevereiro_2018](http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/18_02_08_17_09_36_fevereiro_2018.pdf)
684 [.pdf](http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/18_02_08_17_09_36_fevereiro_2018.pdf)>. Acesso em: 20 fev. 2018.

685 Corrêa JB, Reis Júnior R dos A, Carvalho JG, Guimarães PTG (2001). Avaliação da fertilidade
686 do solo e do estado nutricional de cafeeiros do Sul de Minas Gerais. *Ciência e Agrotecnologia*,
687 25:1279-1286.

688 CRESTE, J. E.; ECHER, F. R. Establishing standards for the integrated recommendation and
689 diagnosis system (DRIS) for irrigated bean crops. *Commun. Soil Science and Plant Analysis*,
690 v. 41, n. 16, p. 1921-1933, 2010.

691 DOBEREINER, J. Manganese toxicity effects In asodulation and nitrogeo fixation of beans
692 (*Pheseolsis vulgaris L.*), in acid soils. *Plant and Soil*, 1966. 14 v. 153-166 p.

693 EPSTEIN, E. *Nutrição mineral das plantas: princípios e perspectivas*. Livros Técnicos e
694 Científicos Editora, 1975. 344 p.

695 GRANGEIRO, L. C.; CECÍLIO FILHO, A. B. Exportação de nutrientes pelos frutos de
696 melancia em função de épocas de cultivo, fontes e doses de potássio. *Horticultura Brasileira*,
697 v. 22, p.740-743, 2004.

698 KURIHARA, C. H. et al. Interpretação de resultados de análise foliar. *Documentos 74*.
699 Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Florestas, p. 42, 2005.

700 LEANDRO, W. M. *Sistema integrado de diagnose e recomendação (DRIS) para a cultura da*
701 *soja (Glycine max L. Merrill) na região de Rio Verde- GO*. Universidade Federal de Goiás,
702 Goiânia, 1998. Tese (Doutorado em Agronomia) 190 f.

703 MALAVOLTA, E. et al. *Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações*.
704 Potafos, 1997. 201 p.

705 MALAVOLTA, E. *Manual de nutrição mineral de plantas*. Agronômica Ceres, p. 638, 2006.

706 MARSCHNER, H. *Mineral nutrition of higher plants*. Academic, 1995. 889 p.

707 MESQUITA, M. A. M. Estado nutricional e normas DRIS para o feijoeiro irrigado em
708 Cristalina, Goiás. *Escola de Agronomia – Universidade Federal de Goias*. Tese de Doutorado
709 em Agronomia, f. 105, 2013.

710 MOTA, J. H. et al., Efeito do cloreto de potássio via fertirrigação na produção de alface-
711 americana em cultivo protegido. *Ciência e Agrotecnologia*, 2001. 25 v. 542-549 p.

712 MOURÃO FILHO, F. A. A. et al. Função e ordem da razão dos nutrientes no estabelecimento
713 de normas DRIS em laranjeira 'Valência'. *Pesquisa agropecuária brasileira*, v. 37, n. 2, p. 185-
714 192, 2002.

715 NEVES, O. S. C. et al. Uso do SPAD-502 na avaliação dos teores foliares de clorofila,
716 nitrogênio, enxofre, ferro e manganês do algodoeiro herbáceo. *Pesquisa agropecuária*
717 *brasileira*, 2005. 40 v. 5 n. 517-521 p.

718 NOGUEIRA, et al. Deficiências de micronutrientes essenciais e toxidez de alumínio e
719 manganês em feijão de corda. *Pesquisa agropecuária brasileira*, 1982. 17 v. 559-563 p.

720 PRADO, R. M. *Nutrição de plantas*. Editora UNESP, p. 82-271, 2008.

721 ROSOLEM, C.A.; MARUBAYASHI, O.M. Seja o doutor do seu feijoeiro. *Encarte do*
722 *Informações Agronômicas*, 1994. 68 n. 16 p.

723 SILVA T. M. R. et al. Toxicidade do zinco em milho cultivado em Latossolo Vermelho
724 Distrófico. *Revista Brasileira de Ciências Agrárias*, 2010. 5 v. 3 n. 336-340 p.

725 SOUZA, D. M. G.; LOBATO, E. *Cerrado: Correção do solo e adubação*. 2ª Ed. Embrapa
726 Informações Tecnológicas, p. 416, 2004.

727 VIEIRA, S. R. et al. Variabilidade espacial dos teores foliares de nutrientes e da produtividade
728 da soja em dois anos de cultivo em um latossolo vermelho. *Revista Brasileira Científica do*
729 *Solo*, 2010. 34 v. 5 n. 1503-1514 p.

730 ZABINI, A. V.; et al. Concentração de micronutrientes e características bioquímicas de
731 progênies de cafeeiros (*Coffea arabica L.*) eficientes no uso de zinco. *Bioscience Journal*, 2007.
732 23 v. 4 n. 95-103 p.

733

734

735 CAPITULO 02 – ESTABELECIMENTO DE NORMAS DRIS PARA A CULTURA DO
736 FEIJÃO PRIMEIRA SAFRA NO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU, GOIAS

737

738 RESUMO

739 A avaliação nutricional pela análise foliar possibilita verificar a capacidade da cultura
740 de absorver os nutrientes, permitindo, com isso, diagnosticar os fatores nutricionais limitantes
741 para a produção. Dessa forma, o feijoeiro que apresenta ciclo reduzido e sistema radicular
742 predominante nas camadas superficiais do solo, pode ser beneficiado por esse diagnóstico,
743 tornando-se uma importante ferramenta para os demais ciclos de cultivo, com informações
744 estritamente locais. Assim, o objetivo do trabalho foi diagnosticar os nutrientes e interações
745 mais limitantes para aumento da produtividade no feijoeiro pela metodologia das faixas de
746 suficiência. O experimento foi conduzido no município de Montividiu-GO, utilizando a cultivar
747 BRSMG Madrepérola com semeadura no início de outubro. Houve o estabelecimento de 7
748 glebas homogêneas, onde foram coletadas 7 amostras composta em cada, totalizando 49
749 amostragens. Uma amostra composta era formada por 30 subamostras, retirando a primeira
750 folha totalmente expandida na época do florescimento. Com os bancos de dados formado,
751 realizou a interpretação dos resultados pela metodologia DRIS. Os resultados obtidos pelo
752 desenvolvimento do DRIS para maioria dos nutrientes não foram semelhantes a literatura já
753 existente. O nitrogênio é o nutriente com maior frequência na classe de excesso nas plantas de
754 feijão. Enquanto o elemento S está com 88% das amostradas enquadradas como suficientes.
755 Foi possível chegar à conclusão que o DRIS possibilita um maior conhecimento nutricional da
756 região estudada.

757

758 Palavras-chave: *Phaseolus vulgaris*, dris, análise foliar.

759

760 CHAPTER 02 - ESTABLISHMENT OF DRIS STANDARDS FOR THE CULTURE OF THE
761 FIRST SAFRA BEAN IN THE MUNICIPALITY OF MONTIVIDIU, GOIAS.

762

763 ABSTRACT

764 The nutritional evaluation through the foliar analysis allows to verify the capacity of absorption
765 of nutrients, allowing, with this, to diagnose the nutritional limiting factors for the production.
766 Thus, bean plants that present reduced cycle and root system predominant in the superficial
767 layers of the soil, can be benefited by this diagnosis, becoming an important tool for the
768 cultivation of large quantities, with the best local information. Thus, the objective of the study
769 was to diagnose the nutrients and the most limiting interactions for the increase of productivity
770 without the use of militancy of the ranges of sufficiency. The experiment was conducted in the
771 municipality of Montividiu-GO, using a cultivar BRSMG Madrepérola with sowing in early
772 October. There were collected the 7 homogeneous vegetables, where they were collected. 7
773 samples composed in each, totaling 49 samples. A composite sample was formed by 30
774 subsamples, removing a first fully expanded leaf at the time of flowering. With the databases
775 formed, an analysis of the results was carried out at the level of the DRIS methodology. The
776 results obtained by the DRIS project for most of the supports were not similar to an existing
777 literature. Nitrogen is the nutrient with higher frequency and greater capacity in bean plants.
778 While element S is with 88% of the samples registered as sufficient. The DRIS allowed a great
779 nutritional knowledge of the studied region.

780

781 Keywords: *Phaseolus vulgaris*, dris, leaf analysis

782

783

784

785 1. INTRODUÇÃO

786 A cultura do feijão comum (*Phaseolus vulgaris* L.) está distribuída em todo o território
787 nacional brasileiro, podendo ser cultivada em três diferentes períodos, primeira safra (das
788 águas), segunda safra (da seca) e terceira safra (de inverno), encontrada principalmente em
789 produtores com alta tecnologia obrigatoriamente à irrigação. Dessa forma o Brasil ocupa a
790 posição de terceiro maior produtor mundial de feijão, atrás apenas de Myanmar e Índia (Conab
791 2017). Na safra 2016/17 o Brasil atingiu uma produção total de 3,2 milhões de toneladas, sendo
792 que o Centro-Oeste contribuiu com 14,9% deste valor, tendo o estado de Goiás com a maior
793 produtividade brasileira, 2.507 kg ha⁻¹ (Conab 2018).

794 Para obter elevadas produtividades na cultura do feijão a nutrição mineral ofertada a
795 planta tem que estar de acordo com a necessidade da cultura justificado pelo volume de solo
796 explorado pelo feijoeiro ser baixo. Dessa forma, é fundamental que o nutriente seja colocado à
797 disposição da planta, em tempo e local adequados (Rosolem & Marubayashi 1994). No entanto,
798 nem sempre o manejo nutricional aplicado a cultura, resulta em produtividade esperada, sendo
799 indicado realizar uma avaliação foliar para o acompanhamento da nutrição da planta.

800 A diagnose nutricional para o feijoeiro com base nos teores presentes nos tecidos
801 vegetais pode ser mais eficiente quando comparado somente as análises de solo, pois as
802 concentrações dos elementos minerais encontrados correlacionam entre a absorção dos
803 nutrientes realizado pelas plantas e o manejo de adubação.

804 A análise química foliar detecta respostas em diversas culturas, aos vários tipos de
805 manejo, possibilitando interpretar de maneira mais eficiente, as relações entre os nutrientes na
806 planta, e também interferir no sistema adotado, elevando as possibilidades de melhores
807 resultados produtivos (Farnezi et al. 2010). Normalmente é realizada na época de maior
808 necessidade nutricional, sendo sem dúvidas, uma das melhores ferramentas para avaliar a

809 disponibilidade dos nutrientes no solo e a capacidade de absorção da planta de extrair os
810 próprios elementos químicos de forma eficiente (Vieira et al. 2010).

811 A correta interpretação de resultados de análises foliares, proporciona informações que
812 favorecem o uso racional de insumos, evita desperdício, melhora o equilíbrio nutricional das
813 plantas e, conseqüentemente, proporciona aumento da produtividade. Portanto, preconiza-se a
814 utilização de métodos que disponibilizam subsídios para um diagnóstico nutricional eficiente e
815 prático, a partir de resultados analíticos das folhas de uma planta e/ou lavoura (Partelli 2004).

816 Entre os métodos de interpretação dos resultados das análises químicas foliares, o
817 Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação (DRIS) tem lugar de destaque, pois o método
818 é baseado em um índice gerado para cada nutriente, o qual permite determinar a disponibilidade
819 relativa de cada nutriente. Esse índice é obtido comparando-se as relações na forma de
820 quociente entre um nutriente e cada um dos demais presentes na amostra sob diagnose,
821 comparando esse valor com valores de referência envolvendo as mesmas relações em
822 populações sadias e produtivas, denominada de população de referência (Castamann et al.
823 2012).

824 O DRIS, além de ferramenta para diagnóstico, possibilita estimar o nível crítico no
825 tecido foliar para cada nutriente em condições de equilíbrio nutricional a partir de um banco de
826 dados coletados em campo, como demonstraram Needham et al. (1990).

827 Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar o estado nutricional do feijoeiro e definir
828 as faixas de suficiência para o município de Montividiu, GO, safra 2016/17, por meio das
829 concentrações de nutrientes determinadas por análise foliar e interpretadas pelo Sistema
830 Integrado de Diagnose e Recomendação (DRIS).

831

832

833

834 2. MATERIAL E MÉTODOS

835 O trabalho foi desenvolvido entre outubro de 2016 e janeiro de 2017, na fazenda Bom
836 Jardim, localizado no município de Montividiu (17°16'57"S e 51°19'41"O), região sudoeste
837 goiano, com a cultura do feijão comum, cultivar BRSMG Madrepérola, feijão carioca com
838 tegumento claro e de longa duração. Segundo Koppen (1948), o clima da região é caracterizado
839 por duas estações bem definidas: uma chuvosa e quente (outubro a abril) e outra fria e seca
840 (maio a setembro).

841 A cultura do feijão foi implantada dentro do sistema de rotação em plantio direto,
842 posteriormente ao algodão safrinha. A semeadura ocorreu entre os dias 01 e 06 de outubro de
843 2016, com população de 211.111 mil plantas por hectare, no espaçamento de 0,45m entre linhas
844 de semeadura.

845 Devido a rotação de cultura e com base na análise de solo, não houve adubação de
846 plantio na cultura do feijão, considerando que a cultura anterior, no caso o algodão, forneceria
847 os nutrientes necessários para o desenvolvimento inicial do feijoeiro. Sendo assim, o manejo
848 de adubação utilizado no algodão foi de 150 kg ha⁻¹ de MAP no plantio, 180 kg ha⁻¹ de KCl no
849 estádio V3 e 450 kg ha⁻¹ de ureia parcelado em três aplicações proporcionais de 150 kg no
850 estádio vegetativo até o primeiro botão floral. Houve também manejo nutricional de
851 micronutrientes, onde foi aplicado: 28g ha⁻¹ de cobre, 230g ha⁻¹ de manganês, 391g ha⁻¹ de boro
852 e 63 g ha⁻¹ de zinco.

853 Para o manejo de adubação, antecipando o plantio, realizou a lanço 280 kg ha⁻¹ de
854 superfosfato simples (18% P₂O₅; 18-20% Ca; 11-12% S). Na adubação em cobertura, utilizou
855 250 kg ha⁻¹ do formulado 45-00-00, sendo a primeira aplicação na dose de 150 kg ha⁻¹ no estádio
856 V2 e a segunda com 100 kg ha⁻¹ no estádio V4. No período de floração, foi realizada uma
857 aplicação de manganês, com fornecimento de 26g ha⁻¹ do nutriente:

858 Foram estabelecidas 7 glebas para amostragem das folhas do feijão com o objetivo de
859 diagnosticar o estado nutricional, a definição de glebas partiu do preceito de que as áreas
860 apresentavam homogeneidade do solo, palhada e desenvolvimento do feijoeiro. Em cada gleba
861 foram coletadas 7 amostras compostas, totalizando 49 pontos de amostragem com marcação
862 das coordenadas geográficas e altitude, para facilitar a localização no momento de colheita.

863 Cada amostra foliar composta foi formada por 30 subamostras coletadas de forma
864 aleatória, sendo o caminhamento entre as amostras realizado em ziguezague. As amostragens
865 foram coletadas no período do florescimento, retirando a primeira folha madura a partir dos
866 folíolos superiores. Após a coleta, as folhas foram colocadas em saco de papel com
867 identificação e encaminhadas para o laboratório, onde foram secas, moídas e submetidas a
868 análises dos teores totais de nitrogênio, fosforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro,
869 cobre, ferro, manganês e zinco.

870 A colheita mecanizada iniciou no dia 27 de dezembro de 2016, no mesmo realizou a
871 amostragem de produtividade manual, em cada ponto amostral foram coletadas 3 metros
872 lineares de plantas de feijão, composta por 3 subamostras de 1 metro. Essas plantas foram
873 arrancadas e armazenadas em sacos plásticos para transporte até o local de secagem, as amostras
874 foram distribuídas individualmente em ambiente aberto para diminuição da umidade para
875 realização da trilha manual, posteriormente foram pesadas e retiradas umidade por meio do
876 medidor de umidade de grãos, com finalidade de estimar produtividade em cada ponto amostral.

877 Para utilização do método Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação (DRIS), os
878 resultados obtidos das análises foliares e suas respectivas produtividades foram utilizados para
879 compor um banco de dados. O banco de dados foi dividido em dois subgrupos, de acordo com
880 o critério de produtividade: amostras advindas de talhões de alta (população de referência) e de
881 baixa produtividade (população de não referência), sendo consideradas de alta produtividade
882 os talhões com produtividade acima da média mais $2/3$ de desvio padrão (Serra et al. 2013). A

883 partir da população de referência foram obtidas as normas DRIS, calculando a média, o desvio
 884 padrão e o coeficiente de variação, dos teores dos nutrientes da análise foliar e das relações
 885 binárias possíveis, relações dois a dois destes teores (Beaufils 1971, 1973).

886 Com os valores das médias definidas, tanto para população referência quanto a
 887 população de baixa produtividade, realizou o comparativo dos resultados encontrados no
 888 presente experimento com a interpretação dos resultados de outros autores (Tabela 1)

889

890 Tabela 1. Concentração adequada de nutrientes em folhas do feijoeiro comum segundo vários
 891 autores.

Variável	Autores								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
N	dag kg ⁻¹	1,5-2,6	3-3,5	2,5	3,0-5,0	3,0-3,5	3	4,4-5,8	4,11-4,37
P	dag kg ⁻¹	0,1-0,4	0,4-0,7	0,33	0,2-0,3	0,4-0,7	0,3	0,43-0,55	0,36-0,44
K	dag kg ⁻¹	0,9-4,5	2,7-3,5	2,8	2-2,5	2,7-3,5	2	2,3-2,8	1,63-1,85
Ca	dag kg ⁻¹	0,4-4,0	2,5-3,5	2,5	1,5-2,0	2,5-3,5	2,5	1,0-1,55	1,14-1,40
Mg	dag kg ⁻¹	0,5-0,9	0,3-0,6	0,45	0,4-0,7	0,3-0,6	0,5	0,33-0,46	0,39-0,45
S	dag kg ⁻¹	0,7-0,8	0,15-0,20	-	0,5-1,0	0,15-0,20	0,2	0,24-0,4	0,17-0,22
B	mg kg ⁻¹	-	100-150	32	30-60	100-150	20	33,7-62	55,13-69,17
Cu	mg kg ⁻¹	-	-	8	10-20	8-10	8	8,6-36	5,19-8,71
Fe	mg kg ⁻¹	-	300-500	626	100-450	300-500	-	13-281	237,1-284,7
Mn	mg kg ⁻¹	-	200-300	122	30-300	200-300	-	46-108	144,2-187
Zn	mg kg ⁻¹	-	-	51	20-100	45-55	30	45-74	39,97-51,53

892 ⁽¹⁾ 1:Cobra Neto et al., (1971); 2: Hiroce et al. (1970); 3: Feitosa et al. (1980); 4: Malavolta et al. (1997);
 893 5: Comissão de Fertilidade do Solo de Minas Gerais (2004); 6: Raij (1991); 7: Creste e Echer (2010); 8: Paiva
 894 Junior (2011).

895

896 Os valores médios das concentrações dos nutrientes e das relações das entre os
 897 nutrientes, com suas respectivas variâncias da população de referência, representam culturas
 898 em boas condições nutricionais (Beaufils 1971, 1973, Walworth & Sumner 1987, Malavolta et
 899 al. 1989, Raij 1991). Dessa forma, no presente experimento a população de alta produtividade
 900 foi constituída por 11 normas, onde essas normas foram comparadas as normas da população
 901 de baixa produtividade.

902 Foram calculadas a média e o coeficiente de variação das relações bivariadas entre todos
 903 os nutrientes, considerando as relações diretas e inversas (ex.: A/B ou B/A), tanto para as
 904 populações de referência quanto de não referência. Para determinar quais relações, diretas ou
 905 inversas (A/B ou B/A), que compuseram cada norma foi utilizado o método das razões das
 906 variâncias (valor F) (Jones 1981, Letsch 1985). Para tanto, foram calculadas as variâncias das
 907 relações bivariadas entre nutrientes nas populações de referência e não referência, sendo
 908 escolhidas aquelas que apresentavam a maior razão de variâncias, conforme o seguinte
 909 exemplo:

910 Se, $\left[\left(\frac{s^2(\frac{A}{B})_{baixa\ produtividade}}{s^2(\frac{A}{B})_{alta\ produtividade}} \right) > \left(\frac{s^2(\frac{B}{A})_{baixa\ produtividade}}{s^2(\frac{B}{A})_{alta\ produtividade}} \right) \right]$, então: a relação utilizada

911 para compor as normas será A/B, do contrário, será B/A. Sendo: S^2 = variância da relação dual
 912 entre nutrientes.

913 Para o cálculo dos índices DRIS dos nutrientes, foi necessário anteriormente realizar as
 914 transformações dos dados obtidos das relações através das funções reduzidas. As funções
 915 reduzidas foram calculadas conforme Beaufils (1971, 1973) e Oliveira (1998), pela formula Z,
 916 descritos pelas equações 1, 2 e 3, que levam em consideração se a relação dos nutrientes da
 917 amostra em questão é maior ou não que a relação dos nutrientes da população de referência.

918 Se $A/B < a/b$: $Z \left(\frac{A}{B} \right) = \left[1 - \frac{a/b}{A/B} \right] \cdot \frac{Kt}{CV_{a/b}}$; (1)

919 Se $A/B = a/b$: 0; (2)

920
$$\text{Se } A/B > a/b: Z \left(\frac{A}{B} \right) = \left[\frac{a/b}{A/B} - 1 \right] \cdot \frac{Kt}{CV_{a/b}}; (3)$$

921 Onde: A/B: é o quociente da relação bivariada da amostra em análise e interpretação;
922 a/b: é a média da relação bivariada da população de referência; $CV_{a/b}$: é o coeficiente de
923 variação da razão dos nutrientes A e B da população de alta produtividade; Kt: é o coeficiente
924 de sensibilidade que tem valor arbitrário, e foi utilizado o valor 100.

925 Após o cálculo das funções reduzidas, o procedimento para calcular os valores dos
926 índices DRIS de cada nutriente foram determinados conforme proposto por Beaufils (1973),
927 equação 4:

928
$$\text{Índice DRIS } A = \frac{\sum f \left(\frac{A}{B} \right) - \sum f \left(\frac{B}{A} \right)}{n+m} (4)$$

929 Em que: A/B são as relações normais reduzidas diretas; B/A são as relações normais
930 reduzidas inversas; n: é o número de funções DRIS calculadas utilizando a relação direta (A/B);
931 m: é o número de funções DRIS calculadas utilizando a relação inversa (B/A).

932 Os índices DRIS foram interpretados empregando o procedimento padrão proposto por
933 Beaufils (1971). Valores negativos significam deficiência do elemento em relação aos demais;
934 valores positivos indicam um excesso e, quando mais próximos de zero estiverem esses índices,
935 mais próxima estará a planta do equilíbrio nutricional. Obteve-se também a porcentagem de
936 ocorrência na primeira, segunda e terceira ordem que correspondem ao primeiro, segundo, e
937 terceiro índice mais negativo e mais positivo, respectivamente, em cada ponto de amostragem.
938 Em seguida calculou-se a média das três ordens, mais negativo e mais positivo.

939 Complementando a interpretação dos índices DRIS, também foi realizada o
940 procedimento proposto por Leandro (1998), onde considera a porcentagem de ocorrência dos
941 nutrientes classificados como: primeiro, segundo e terceiro índice mais negativo (deficiência)
942 do ponto de amostragem. Obteve também a porcentagem de ocorrência para os índices

943 classificados como os mais positivos (excesso). Em seguida calculou -se média das três ordens,
944 tanto para os mais negativos quanto para os mais positivos.

945 O Índice de Balanço Nutricional (IBN) foi calculado pela soma, em módulo, dos índices
946 DRIS para cada variável da análise foliar em cada ponto de amostragem. Quanto menor for o
947 IBN, mais próxima a amostra estará do equilíbrio nutricional (Beaufils 1973; Walworth &
948 Sumner 1987), conforme seguinte equação (5).

$$949 \quad \text{IBN} = \sum |X \text{ indice DRIS} | (5)$$

950 Com o propósito de avaliar a eficácia das normas obtidas, os valores de IBN (índice de
951 balanço nutricional) obtidos com cada uma das normas foram relacionados com as
952 produtividades das 49 amostras, por meio de regressão polinomial.

953 Foram obtidas as Faixas de Beaufils para interpretação de análises de folhas, foram
954 calculados os ajustes de equações polinomiais entre os teores dos nutrientes (variável
955 independente - Y), e os índices DRIS (variável dependente - X) nas análises de folha (Oliveira
956 & Souza 1988; Oliveira 1993). Após essa análise, foi estabelecido, utilizando as equações
957 geradas, o teor ótimo de cada nutriente com base na norma escolhida. Esse teor, definido como
958 ponto de equilíbrio nutricional, é aquele em que o índice de balanço nutricional é nulo, ou seja,
959 é o teor em que o nutriente é considerado não limitante por falta ou excesso. Em seguida, para
960 cada nutriente, foram definidas cinco classes de teores foliares, elencadas com base em seus
961 valores de índices DRIS, de acordo com os seguintes intervalos dados em unidades de desvio
962 padrão (s): menor que $-4/3s$ = deficiente; entre $-4/3$ e $2/3s$ = tendência à deficiência; entre -
963 $2/3$ e $2/3s$ = suficiente; entre $2/3$ e $4/3s$ = tendência à excessiva; maior que $4/3 s$ = excessiva
964 (Beaufils, 1973).

965 Com as faixas de suficiência regionalizada definidas para o experimento, foi realizado
966 o quando de distribuição de frequência, com o objetivo de quantificar a interpretação dos
967 resultados obtidos nas análises foliares.

968 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

969 3.1 Normas foliares para feijão

970 Quando avaliado a média de um determinado nutriente com diversas referências (Tabela
971 1), podemos notar uma variação entre as faixas de suficiência muito grande, onde o teor pode
972 ser enquadrado em diferentes classes, apenas alterando o autor. O nitrogênio, enquadrado para
973 sete referências como excesso, tanto para a população alta quanto baixa. Segundo Malavolta
974 (1997), o teor de N da população baixa classifica como excesso, já a população alta estaria
975 adequada. Somente para Creste e Echer (2010), a concentração estaria como adequada.

976 Os valores encontrados, justificando o excesso para maioria das referências, se deve as
977 novas tecnologias e manejo empregado atualmente nas culturas, ocorrendo aplicação de adubos
978 foliares contendo o elemento (Paiva Junior 2011). Adicionalmente, no presente experimento,
979 houve também aplicação de nutriente na adubação de cobertura, nos estádios V2 e V4.

980 Na comparação com outros autores (Tabela 1), a média de fósforo da população alta e
981 baixa estão em excesso na cultura do feijão, para três autores estão em quantidade adequada
982 para a planta e apenas para Malavolta (1997), a concentração de fósforo para a população baixa
983 está em excesso e adequado para a população alta.

984 Nota-se uma concordância entre todas as referências para o nutriente potássio, uma vez
985 que estaria em excesso em ambas populações. Ocorrem também para a concentração dos
986 micronutrientes: manganês e zinco

987 A média do teor de enxofre (S) para a produção baixa, para os autores Cobra Neto
988 (1971), Malavolta (1997) estaria classificada como deficiência. Para os autores: Hiroce (1970),
989 Comissão de fertilidade do solo de Minas Gerais (2004), Raij (1991) e Paiva Junior (2011), o
990 teor de enxofre se enquadraria em excesso. Apenas para Creste e Echer (2010) a média de
991 enxofre seria adequado. Com base nessas diferenças, é possível notar a importância da

992 formação de faixas de suficiência regionalizada, uma vez que as condições edafoclimáticas e
993 entre outros podem interferir na nutrição das plantas de feijão.

994 Dessa forma, o desenvolvimento do sistema de diagnose nutricional integrado (DRIS),
995 se torna uma ferramenta de grande importância por apresentar de maneira rápida e prática os
996 valores de referência, faixas de suficiência (FS), para interpretação dos resultados das análises
997 foliares.

998 As médias das relações entre os nutrientes interferem na elaboração das faixas de
999 suficiência, pois é necessário optar pela interação entre os nutrientes que apresentar maior valor.
1000 Escolhida a relação, os índices de cada elemento podem se alterar, caso o nutriente esteja como
1001 numerador ou divisor (Tabela 2). Como exemplo do nitrogênio, foi possível verificar que em
1002 nove das dez relações o elemento N está como numerador, e apenas uma relação o N apresenta
1003 como divisor.

1004
1005 Tabela 2. Normas foliares DRIS (média, desvio padrão e coeficiente de variação) para os
1006 nutrientes e suas relações dois a dois, para população de baixa e alta produtividade do feijão
1007 sequeiro, no município de Montividiu, GO, safra 2016/17 (n= 49 amostras)

Variável	---População Baixa----			----População Alta----		
	Média	Desvio Padrão	CV%	Média	Desvio Padrão	CV%
N	51,731	5,780	11,173	48,525	11,101	22,876
P	4,588	0,616	13,422	4,659	1,841	39,515
K	49,691	6,865	13,815	48,723	11,184	22,955
Ca	23,428	3,315	14,148	22,551	4,969	22,036
Mg	6,076	0,877	14,434	6,110	1,987	32,513
S	3,493	0,481	13,775	3,700	1,891	51,119

Variável	---População Baixa---			----População Alta----		
	Média	Desvio Padrão	CV%	Média	Desvio Padrão	CV%
B	54,769	6,977	12,740	51,111	11,640	22,774
Cu	11,829	2,810	23,759	12,346	3,554	28,789
Fe	193,842	17,241	8,894	185,600	47,175	25,418
Mn	386,724	24,371	6,302	373,415	94,446	25,292
Zn	134,868	20,623	15,291	132,665	58,108	43,801
N/P	11,552	2,437	21,100	10,871	1,790	16,462
P/N	0,090	0,019	21,215	0,095	0,019	19,805
N/K	1,062	0,189	17,755	0,939	0,160	17,063
K/N	0,975	0,193	19,788	1,097	0,189	17,192
N/Ca	2,278	0,562	24,690	2,066	0,291	14,067
Ca/N	0,461	0,091	19,767	0,496	0,087	17,478
N/Mg	8,782	2,126	24,204	8,069	0,861	10,676
Mg/N	0,120	0,024	20,331	0,125	0,014	11,135
N/S	15,127	2,934	19,397	13,795	2,412	17,482
S/N	0,069	0,013	19,125	0,075	0,014	18,973
N/B	0,963	0,181	18,823	0,959	0,182	18,964
B/N	1,075	0,202	18,794	1,085	0,227	20,912
N/Cu	4,693	1,546	32,935	4,089	0,864	21,135
Cu/N	0,233	0,065	27,922	0,257	0,061	23,834
N/Fe	0,269	0,039	14,650	0,270	0,034	12,486
Fe/N	3,791	0,516	13,617	3,758	0,454	12,081
N/Mn	0,134	0,018	13,352	0,133	0,013	9,629

Variável	---População Baixa---			----População Alta----		
	Média	Desvio Padrão	CV%	Média	Desvio Padrão	CV%
Mn/N	7,573	1,009	13,325	7,584	0,759	10,011
N/Zn	0,393	0,076	19,285	0,399	0,041	10,296
Zn/N	2,638	0,490	18,590	2,534	0,254	10,019
P/K	0,093	0,013	14,183	0,087	0,012	14,042
K/P	10,936	1,595	14,590	11,693	1,684	14,399
P/Ca	0,199	0,032	15,993	0,192	0,023	11,893
Ca/P	5,151	0,770	14,953	5,280	0,642	12,159
P/Mg	0,766	0,121	15,845	0,756	0,103	13,681
Mg/P	1,336	0,196	14,709	1,347	0,178	13,222
P/S	1,331	0,219	16,424	1,288	0,227	17,588
S/P	0,771	0,124	16,047	0,802	0,148	18,466
P/B	0,085	0,013	15,670	0,089	0,014	15,293
B/P	12,099	2,015	16,652	11,518	1,810	15,710
P/Cu	0,404	0,080	19,848	0,376	0,049	13,038
Cu/P	2,586	0,593	22,937	2,700	0,314	11,623
P/Fe	0,024	0,004	15,688	0,025	0,003	12,670
Fe/P	42,953	6,708	15,618	40,199	4,473	11,126
P/Mn	0,012	0,002	15,768	0,013	0,002	16,365
Mn/P	85,723	11,849	13,822	81,764	12,261	14,995
P/Zn	0,035	0,007	19,036	0,038	0,009	23,556
Zn/P	29,783	5,322	17,868	27,591	5,496	19,920
K/Ca	2,160	0,394	18,241	2,233	0,339	15,165

Variável	---População Baixa---			----População Alta----		
	Média	Desvio Padrão	CV%	Média	Desvio Padrão	CV%
Ca/K	0,478	0,082	17,206	0,458	0,067	14,650
K/Mg	8,405	1,946	23,156	8,740	1,089	12,461
Mg/K	0,125	0,026	21,085	0,116	0,014	12,146
K/S	14,479	2,686	18,547	14,840	2,227	15,005
S/K	0,072	0,015	20,428	0,069	0,010	14,471
K/B	0,921	0,170	18,460	1,024	0,115	11,197
B/K	1,121	0,200	17,835	0,989	0,113	11,419
K/Cu	4,457	1,244	27,916	4,389	0,776	17,683
Cu/K	0,243	0,072	29,722	0,235	0,043	18,432
K/Fe	0,257	0,034	13,366	0,291	0,026	8,816
Fe/K	3,956	0,532	13,455	3,464	0,319	9,213
K/Mn	0,129	0,021	16,261	0,144	0,017	11,872
Mn/K	7,934	1,212	15,274	7,031	0,854	12,149
K/Zn	0,377	0,078	20,574	0,436	0,079	18,137
Zn/K	2,760	0,537	19,453	2,369	0,422	17,829
Ca/Mg	3,901	0,565	14,485	3,942	0,337	8,549
Mg/Ca	0,263	0,046	17,644	0,256	0,022	8,519
Ca/S	6,817	1,288	18,895	6,704	0,856	12,772
S/Ca	0,152	0,032	20,859	0,152	0,021	13,925
Ca/B	0,435	0,080	18,402	0,466	0,069	14,751
B/Ca	2,402	0,598	24,896	2,200	0,378	17,183
Ca/Cu	2,071	0,465	22,458	1,981	0,329	16,596

Variável	---População Baixa---			----População Alta----		
	Média	Desvio Padrão	CV%	Média	Desvio Padrão	CV%
Cu/Ca	0,511	0,135	26,368	0,517	0,076	14,605
Ca/Fe	0,122	0,020	16,604	0,132	0,018	13,848
Fe/Ca	8,472	1,598	18,857	7,681	0,947	12,335
Ca/Mn	0,061	0,009	15,351	0,065	0,008	11,509
Mn/Ca	16,909	3,079	18,210	15,515	1,791	11,545
Ca/Zn	0,178	0,038	21,167	0,198	0,039	19,542
Zn/Ca	5,896	1,362	23,103	5,230	0,877	16,772
Mg/S	1,756	0,270	15,397	1,710	0,238	13,905
S/Mg	0,583	0,090	15,450	0,597	0,091	15,274
Mg/B	0,113	0,023	19,927	0,119	0,018	14,961
B/Mg	9,249	2,036	22,017	8,641	1,475	17,066
Mg/Cu	0,534	0,111	20,757	0,506	0,094	18,555
Cu/Mg	1,957	0,423	21,620	2,040	0,353	17,291
Mg/Fe	0,032	0,006	18,457	0,034	0,003	9,427
Fe/Mg	32,859	7,420	22,582	30,051	2,791	9,286
Mg/Mn	0,016	0,002	15,705	0,017	0,001	7,240
Mn/Mg	65,148	11,236	17,247	60,700	4,434	7,304
Mg/Zn	0,046	0,008	18,507	0,050	0,007	13,278
Zn/Mg	22,547	3,987	17,685	20,396	2,628	12,885
S/B	0,065	0,013	20,137	0,070	0,008	11,336
B/S	16,021	3,301	20,606	14,513	1,516	10,447
S/CU	0,308	0,062	20,243	0,299	0,056	18,713

Variável	---População Baixa---			----População Alta----		
	Média	Desvio Padrão	CV%	Média	Desvio Padrão	CV%
Cu/S	3,390	0,698	20,595	3,452	0,603	17,478
S/Fe	0,018	0,003	16,433	0,020	0,003	14,673
Fe/S	56,546	9,564	16,914	51,167	7,364	14,393
S/Mn	0,009	0,001	13,993	0,010	0,001	13,680
Mn/S	112,499	14,827	13,180	103,256	12,498	12,104
S/Zn	0,026	0,005	18,822	0,030	0,005	16,022
Zn/S	39,129	6,927	17,702	34,610	5,028	14,527
B/Cu	4,919	1,468	29,849	4,311	0,759	17,601
Cu/B	0,219	0,057	26,016	0,239	0,041	16,981
B/Fe	0,285	0,046	16,291	0,287	0,036	12,624
Fe/B	3,598	0,559	15,536	3,536	0,438	12,376
B/Mn	0,142	0,021	15,068	0,143	0,023	15,810
Mn/B	7,180	1,020	14,207	7,177	1,030	14,352
B/Zn	0,416	0,086	20,578	0,429	0,080	18,538
Zn/B	2,506	0,511	20,407	2,415	0,469	19,402
Cu/Fe	0,062	0,016	26,504	0,068	0,014	19,853
Fe/Cu	17,436	4,895	28,072	15,189	3,017	19,865
Cu/Mn	0,031	0,007	22,268	0,034	0,006	18,164
Mn/Cu	34,463	7,984	23,167	30,610	5,301	17,316
Cu/Zn	0,089	0,021	23,132	0,102	0,025	24,523
Zn/Cu	11,950	3,038	25,426	10,300	2,063	20,033
Fe/Mn	0,504	0,058	11,499	0,497	0,054	10,816

Variável	---População Baixa---			----População Alta----		
	Média	Desvio Padrão	CV%	Média	Desvio Padrão	CV%
Mn/Fe	2,013	0,235	11,677	2,036	0,231	11,368
Fe/Zn	1,481	0,315	21,279	1,498	0,236	15,722
Zn/Fe	0,705	0,143	20,246	0,685	0,113	16,572
Mn/Zn	2,943	0,528	17,947	3,006	0,278	9,262
Zn/Mn	0,351	0,063	18,009	0,335	0,031	9,135

1008

1009 3.2 Interpretação dos Índices DRIS

1010 Os índices DRIS para cada nutriente e o Índice de Balanço Nutricional (IBN) em cada
1011 ponto de amostragem no município de Montividiu, GO, está representado na Tabela 3.
1012 Complementando a tabela, também foi expressa a ordem de limitação, de forma decrescente,
1013 do nutriente mais deficiente ao mais excessivo.

1014

1015

1016 Tabela 3 Índices DRIS calculados pelo procedimento de Beauflis (1973) e Índice de Balanço Nutricional (IBN) (Beaufils, 1973; Walworth &
 1017 Sumner, 1987) obtidos pelas análises foliar para cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra em 49 pontos de amostragem de folhas no município
 1018 de Montividiu, GO. Safra 2016/17.

Ponto	Prod. (sc ha ⁻¹)	Índices											IBN	Ordem de Limitação
		N	P	K	Ca	Mg	S	B	Cu	Fe	Mn	Zn		
1	72,8	3	0	-1	-2	0	-1	-2	1	-2	-1	1	15	Ca=B=Fe>K=S=Mn>P=Mg>Cu=Zn>N
2	66,2	0	0	0	-1	1	0	0	0	-1	0	0	5	Ca=Fe>N=P=K=S=B=Cu=Mn=Zn>Mg
3	63,5	1	-1	-1	0	0	1	0	0	0	-1	1	7	P=K=Mn>Ca=Mg=B=Cu=Fe>N=S=Zn
4	68,4	0	-1	-4	-3	0	2	0	2	-1	-1	1	17	K>Ca>P=Fe=Mn>N=Mg=B>Zn>S>Cu
5	42,6	2	-1	-3	-1	-1	0	-1	1	0	-1	1	11	K>P=Ca=Mg=B=Mn>S=Fe>Cu=Zn>N
6	64,5	2	-1	-2	-1	-1	-1	0	1	-1	-3	3	16	Mn>K>P=Ca=Mg=S=Fe>B>Cu>N>Zn
7	67,0	1	0	-2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-3	3	13	Mn>K>Mg=S=B=Cu=Fe>P=Ca>N>Zn
8	73,1	1	0	0	-1	1	1	-1	-1	-2	-1	1	10	Fe>Ca=B=Cu=Mn>P=K>N=Mg=S=Zn
9	71,2	1	1	-1	0	0	-1	1	-1	-1	-1	1	8	K=S=Cu=Fe=Mn>Ca=Mg>N=P=B=Zn
10	89,5	2	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	5	K=B>P=Ca=Mg=S=Cu=Fe=Mn=Zn>N
11	81,1	2	0	0	0	1	-1	0	0	0	-1	1	7	S=Mn>P=K=Ca=B=Cu=Fe>Mg=Zn>N

Ponto	Prod. (sc ha ⁻¹)	Índices											IBN	Ordem de Limitação
		N	P	K	Ca	Mg	S	B	Cu	Fe	Mn	Zn		
12	71,8	2	0	-1	0	1	1	-2	0	1	0	0	8	B>K>P=Ca=Cu=Mn=Zn>Mg=S=Fe>N
13	73,8	2	0	0	0	-1	1	0	-2	0	1	-1	9	Cu>Mg=Zn>P=K=Ca=B=Fe>S=Mn>N
14	59,0	2	1	-1	0	-1	1	-1	-1	-1	-3	3	15	Mn>K=Mg=B=Cu=Fe>Ca>P>S>N>Zn
15	57,4	2	-1	-1	1	0	0	0	-2	0	3	-3	14	Zn>Cu>P=K>Mg=S=B=Fe>Ca>N>Mn
16	67,3	2	0	0	1	0	1	-2	0	0	-2	2	11	B=Mn>P=K=Mg=Cu=Fe>Ca=S>N=Zn
17	92,6	2	0	-1	0	0	1	-1	0	-2	0	0	7	Fe>K=B>P=Ca=Mg=Cu=Mn=Zn>S>N
18	77,4	2	-1	-1	0	0	1	-2	0	-2	-1	1	11	B=Fe>P=K=Mn>Ca=Mg=Cu>S=Zn>N
19	79,9	2	0	0	1	0	0	0	-2	0	0	0	6	Cu>P=K=Mg=S=B=Fe=Mn=Zn>Ca>N
20	61,1	2	0	1	0	0	1	-1	-2	0	-3	3	14	Mn>Cu>B>P=Ca=Mg=Fe>K=S>N>Zn
21	62,7	2	-1	-1	0	0	-1	-1	0	1	1	-1	9	P=K=S=B=Zn>Ca=Mg=Cu>Fe=Mn>N
22	70,0	1	0	-2	0	1	-1	-1	0	0	-1	1	9	K>S=B=Mn>P=Ca=Cu=Fe>N=Mg=Zn
23	77,7	2	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	6	S>P=Ca=Mg=B=Cu=Fe=Mn=Zn>K>N
24	73,0	1	2	0	-1	0	-1	0	0	-1	-5	5	16	Mn>Ca>S>Fe>K=Mg=B=Cu>N>P>Zn
25	51,3	0	2	1	0	0	-1	1	1	1	-1	1	8	S=Mn>N=Ca=Mg>K=B=Cu=Fe=Zn>P

Ponto	Prod. (sc ha ⁻¹)	Índices											IBN	Ordem de Limitação
		N	P	K	Ca	Mg	S	B	Cu	Fe	Mn	Zn		
26	89,2	1	2	1	0	1	0	-1	1	2	2	-2	11	Zn>B>Ca=S>N=K=Mg=Cu>P=Fe=Mn
27	85,3	-1	1	-1	2	1	0	1	3	0	2	-2	13	Zn>N=K>S=Fe>P=Mg=B>Ca=Mn>Cu
28	72,6	0	2	-1	2	1	-2	2	1	0	1	-1	13	S>K=Zn>N=Fe>Mg=Cu=Mn>P=Ca=B
29	55,2	1	0	0	1	-1	-3	2	-1	1	0	0	12	S>Mg=Cu>P=K=Mn=Zn>N=Ca=Fe>B
30	64,1	0	0	1	1	-1	-2	2	-1	-1	-4	4	19	Mn>S>Mg=Cu=Fe>N=P>K=Ca>B>Zn
31	70,4	1	0	-1	-3	-3	-1	0	-1	1	2	-2	15	Ca=Mg>Zn>K=S=Cu>P=B>N=Fe>Mn
32	85,7	1	0	1	-1	-1	-1	0	0	-1	0	0	7	Ca=Mg=S=Fe>P=B=Cu=Mn=Zn>N=K
33	90,4	0	0	0	-1	-1	1	2	1	1	-2	2	10	Mn>Ca=Mg>N=P=K>S=Cu=Fe>B=Zn
34	67,2	0	0	1	-1	-1	1	0	0	1	4	-4	13	Zn>Ca=Mg>N=P=B=Cu>K=S=Fe>Mn
35	25,7	-1	1	1	-1	-1	-1	0	1	0	-2	2	10	Mn>N=Ca=Mg=S>B=Fe>P=K=Cu>Zn
36	64,6	1	0	-1	0	0	-2	0	0	-2	0	0	7	S=Fe>K>P=Ca=Mg=B=Cu=Mn=Zn>N
37	63,4	0	0	-2	1	0	-1	0	0	-1	1	-1	8	K>S=Fe=Zn>N=P=Mg=B=Cu>Ca=Mn
38	62,8	0	0	-2	0	1	-1	0	0	-2	1	-1	8	K=Fe>S=Zn>N=P=Ca=B=Cu>Mg=Mn
39	70,7	1	0	-1	0	1	0	1	0	0	4	-4	13	Zn>K>P=Ca=S=Cu=Fe>N=Mg=B>Mn

Ponto	Prod. (sc ha ⁻¹)	Índices											IBN	Ordem de Limitação
		N	P	K	Ca	Mg	S	B	Cu	Fe	Mn	Zn		
40	60,7	0	0	-1	0	1	-1	0	-2	0	-5	5	15	Mn>Cu>K=S>N=P=Ca=B=Fe>Mg>Zn
41	66,3	2	0	-3	0	0	0	1	-1	2	2	-2	14	K>Zn>Cu>P=Ca=Mg=S>B>N=Fe=Mn
42	77,7	0	-1	1	0	0	2	1	-1	1	1	-1	10	P=Cu=Zn>N=Ca>K=B=Fe=Mn>N=S
43	62,7	4	0	-1	-6	-1	-1	3	-3	-2	-3	3	26	Ca>Cu=Mn>Fe>K=Mg=S>P>B=Zn>N
44	71,9	3	-1	2	2	-2	-1	0	-2	2	1	-1	17	Mg=Cu>P=S=Zn>B>Mn>K=Ca=Fe>N
45	19,1	5	-1	0	0	-2	-2	1	-4	-2	-2	2	20	Cu>Mg=S=Fe=Mn>P>K=Ca>B>Zn>N
46	51,5	5	1	2	-1	-4	-1	2	-3	2	2	-2	24	Mg>Cu>Zn>Ca=S>P>K=B=Fe=Mn>N
47	76,4	4	-1	0	0	-3	-2	2	-3	3	1	-1	22	Mg=Cu>S>P=Zn>K=Ca>Mn>B>Fe>N
48	72,7	3	0	-1	-2	-3	-1	0	-3	1	3	-3	19	Mg=Cu=Zn>Ca>K=S>P=B>Fe>N=Mn
49	74,1	2	0	1	-1	-2	-1	-1	-1	1	1	-1	12	Mg>Ca=S=B=Cu=Zn>P>K=Fe=Mn>N

1020 Quando levamos em consideração aos índices dos nutrientes, verificamos que em cada
 1021 ponto amostral o nutriente se portou de uma forma, variando de deficiente, equilíbrio e excesso.
 1022 Para verificar em quais ordens os nutrientes predominam, foi realizado a distribuição de
 1023 frequência dos índices, que podem ser observadas para primeira, segunda e terceira ordem. Essa
 1024 distribuição permite interpretar quais os nutrientes mais limitantes por deficiência e excesso
 1025 (Tabela 4 e 5).

1026 A ordem de limitação por deficiência dos índices DRIS mais negativos (1ª ordem) para
 1027 os teores de nutrientes foi: $Mn > K > S = Fe > Zn > B > Ca > P$. Avaliando as três ordens da limitação
 1028 por deficiência, calculou-se a média total, chegando a seguinte ordenação:
 1029 $Mn > S > K > Zn = Fe > Ca = B > Cu > P = Mg > N$. Com a distribuição dos nutrientes, verificou
 1030 resultados semelhantes ao de Mesquita (2013), onde o autor também encontrou que o nitrogênio
 1031 é o elemento que menos se apresentou na classe de deficiente.

1032 Para a ordenação da limitação por excesso dos índices DRIS mais positivos, para a
 1033 ocorrência dos nutrientes de mais excessivos obteve a seguinte sequência:
 1034 $N > Zn > Mn > P = Mg = S = B > Ca > Cu > Fe$. Verificando a média dos elementos mais excessivos
 1035 encontramos a seguinte ordenação: $N > Zn > Mn > Fe > K > Mg > S > B > Cu >> Ca > P$.

1036

1037 Tabela 4. Porcentagem de ocorrência dos nutrientes mais limitantes por deficiência,
 1038 diagnosticados pelos índices DRIS, obtidos pela análise foliar dos 49 pontos de amostragem de
 1039 folhas no município de Montividiu, GO. Safra 2016/17

Variável	% de Ocorrência			
	1ª Ordem	2ª Ordem	3ª Ordem	Média
N	-	4%	-	1,33%
P	6%	6%	10%	7,33%

Variável	% de Ocorrência			
	1ª Ordem	2ª Ordem	3ª Ordem	Média
K	20%	22%	8%	16,67%
Ca	10%	18%	2%	10%
Mg	-	16%	6%	7,33%
S	18%	24%	10%	17,33%
B	12%	14%	4%	10%
Cu	-	18%	8%	8,67%
Fe	18%	8%	10%	12%
Mn	29%	14%	2%	22,50%
Zn	16%	16%	4%	12%

1040

1041 Tabela 5. Porcentagem de ocorrência dos nutrientes mais limitantes por excesso, diagnosticados
1042 pelos índices DRIS, obtidos pela análise foliar para cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra
1043 em 49 pontos de amostragem de folhas no município de Montividiu, GO. Safra 2016/17

Variável	% de Ocorrência			
	1ª Ordem	2ª Ordem	3ª Ordem	Média
N	53%	18,4%	2%	24,47%
P	8%	-	4%	4%
K	-	18%	4%	7,33%
Ca	4%	10%	-	4,67%
Mg	8%	10%	2%	6,67%
S	8%	12%	-	6,67%
B	8%	12%	-	6,67%

Variável	% de Ocorrência			
	1ª Ordem	2ª Ordem	3ª Ordem	Média
Cu	4%	14%	2%	6,67%
Fe	4%	27%	-	10,33%
Mn	18%	14%	-	10,67%
Zn	29%	16%	-	15%

1044

1045 O índice de balanço nutricional (IBN) auxilia verificar se há um equilíbrio entre os
 1046 nutrientes. Quando maior o IBN melhor será o equilíbrio nutricional global da planta, quanto
 1047 maior o índice mais interferências podem ocorrer entre os nutrientes. Os pontos de amostragem
 1048 apresentaram IBN elevado, acima de zero, com variação entre 5 a 26 (Tabela 3).

1049 A relação entre o índice de balanço e produtividade das amostragens de feijão foi
 1050 apresentada na Figura 1. Nota-se que a distribuição das amostras de maiores produtividades
 1051 está na zona de IBN inferior a 15, posteriormente, a produtividade tende a cair. Para
 1052 amostragem de maior produtividade, 90,4, apresentou IBN igual a 10, enquanto a de menor
 1053 produtividade, 19,1 sc ha⁻¹, apresentou índice de balanço nutricional igual a 20. Os menores
 1054 valores de IBN indicam maior equilíbrio nutricional o que é condição necessária à obtenção de
 1055 elevadas produtividades, embora outros fatores possam também alterar as respostas das plantas
 1056 (Marschner 1995)

1057

1058 Figura 1. Equação de regressão polinomial entre as produtividades (sc ha⁻¹) (Y) e índice de
 1059 equilíbrio nutricional – IBN (X) e coeficiente de regressão (r²) obtidos pelos 49 pontos de
 1060 amostragem, na cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra no município de Montividiu, GO.

1061

1062 3.3 Desenvolvimento e validação das faixas de Beaufils

1063 O relacionamento entre os índices DRIS de um nutriente e seus respectivos teores
 1064 foliares podem indica maior confiabilidade nas normas DRIS (Guimarães 2014). Para maioria
 1065 dos nutrientes avaliados a relação entre índice DRIS e concentração foliares foi positiva, oito
 1066 dos onzes elementos apresentaram esse resultado, dessa forma o aumento do teor de foliar de
 1067 nutrientes há também aumento do valor do índice DRIS (Figura 2 e 3). Apenas para o nutriente
 1068 Fe a equação que melhor se enquadrou foi a linear, para os demais nutrientes a melhor equação
 1069 foi a de segundo grau.

1070 Avaliando o R², para maioria dos nutrientes, os valores foram superiores a 0,77, os altos
 1071 coeficientes de regressão aumentam a confiabilidade nos resultados, e também no
 1072 desenvolvimento posterior das faixas de suficiência regional para as variáveis nas análises
 1073 foliares (Mesquita 2013). Somente, o manganês apresentou baixo valor de R², Rezende (2014),
 1074 também observou menor valor para Mn. Esse tipo de resultado pode indicar que outros fatores
 1075 estão influenciando os índices DRIS desses nutrientes (Serra 2010).

1076

1077

1078

1079 Figura 2. Equação de regressão polinomial entre os teores de macronutrientes da variável (Y) e
 1080 o seu índice DRIS (X) na análise foliar e coeficiente de regressão (r^2) obtidos pelos 49 pontos
 1081 de amostragem, na cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra no município de Montividiu, GO
 1082

1083

1084

1085

1086 Figura 3. Equação de regressão polinomial entre os teores de micronutrientes da variável (Y) e
 1087 o seu índice DRIS (X) na análise foliar e coeficiente de regressão (r^2) obtidos pelos 49 pontos
 1088 de amostragem, na cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra no município de Montividiu,
 1089 GO.

1090

1091 Os critérios definidos por Beaufigs (1973), quando o índice DRIS for nulo significa que
1092 o nutriente avaliado é considerado nutricionalmente equilibrado nas lavouras. Com base nas
1093 relações entre os índices DRIS e os teores de nutrientes na folha, foi possível obter equações
1094 que, a partir dela é possível encontrar o ponto de equilíbrio nutricional para cada nutriente
1095 definido (Tabela 6).

1096 Os teores ótimos obtidos no presente trabalho foram maiores que os determinados por
1097 Mesquita (2013), com exceção do N, P e Fe. Essas diferenças, evidenciam a importância do
1098 desenvolvimento de normas específicas para diagnóstico nutricional de plantas, o que, em
1099 muitos casos, pode melhorar os diagnósticos obtidos (Dias et al. 2010). Contudo, é necessário
1100 avaliar ainda as faixas de teores obtidas para cada nutriente, conjuntamente às demais análises
1101 realizadas, considerando que a avaliação pontual dada pelo teor ótimo pode gerar erros,
1102 principalmente quando a variabilidade do teor do nutriente for elevada (Guimarães 2014).

1103

1104 Tabela 6. Ponto de equilíbrio das variáveis, N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn, obtidos
1105 pela análise foliar em 49 pontos de amostragem, na cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra
1106 no município de Montividiu, GO

Nutrientes	Ponto de equilíbrio nutricional
N (g kg ⁻¹)	48,282
P (g kg ⁻¹)	4,5619
K (g kg ⁻¹)	52,844
Ca (g kg ⁻¹)	24,264
Mg (g kg ⁻¹)	6,3918
S (g kg ⁻¹)	3,6935
B (mg kg ⁻¹)	54,534
Cu (mg kg ⁻¹)	12,809

Nutrientes	Ponto de equilíbrio nutricional
Fe (mg kg-1)	194,16
Mn (mg kg-1)	387,99
Zn (mg kg-1)	130,63

1107

1108 As faixas de suficiência com base na metodologia de Beaufils, foram desenvolvidas para
 1109 a cultura do feijão no município de Montividiu, apresentadas na Tabela 7. A partir dessas faixas,
 1110 foram realizadas a interpretação das análises foliares e diagnosticadas os pontos amostrais,
 1111 sendo que a distribuição de frequência para cada classe foi apresentada na Tabela 8.

1112

1113 Tabela 7. Faixas de suficiência das variáveis N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn, obtidos
 1114 pelo desenvolvimento da metodologia DRIS para a cultura do feijoeiro sequeiro primeira safra
 1115 no município de Montividiu, GO

Nutriente	Deficiência	Tendência à deficiência	Suficiente	Tendência à excesso	Excesso
N (g kg-1)	<46,6	46,6 - 47,44	47,44 - 49,12	49,12 - 49,96	>49,96
P (g kg-1)	<3,46	3,46 - 4,01	4,01 - 5,11	5,11 - 5,66	>5,66
K (g kg-1)	<51,2	51,20 - 52,02	52,02 - 53,67	53,67 - 54,49	>54,49
Ca (g kg-1)	<22,5	22,50 - 23,38	23,38 - 25,15	25,15 - 26,03	>26,03
Mg (g kg-1)	<4,79	4,79 - 5,59	5,59 - 7,19	7,19 - 7,99	>7,99
S (g kg-1)	<2,26	2,26 - 2,98	2,98 - 4,41	4,41 - 5,13	>5,13
B (mg kg-1)	<53,06	53,06 - 53,79	53,79 - 55,27	55,27 - 56,01	>56,01
Cu (mg kg-1)	<10,87	10,87 - 11,84	11,84 - 13,78	13,78 - 14,75	>14,75
Fe (mg kg-1)	<192,61	192,61 - 193,39	193,39 - 194,93	194,93 - 195,71	>195,71
Mn (mg kg-1)	<385,25	385,25 - 386,62	386,62 - 389,36	389,36 - 390,73	>390,73
Zn (mg kg-1)	<127,89	127,89 - 129,26	129,26 - 132,00	132,00 - 133,37	>133,37

1116 Tabela 8. Distribuição de frequência das variáveis, N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn,
 1117 obtidos pela análise foliar em 49 pontos de amostragem, na cultura do feijoeiro sequeiro
 1118 primeira safra no município de Montividiu, GO

Nutriente	Deficiência	Tendência à deficiência	Suficiente	Tendência à Excesso	Excesso
N	24%	2%	14%	8%	51%
P	4%	12%	69%	4%	10%
K	63%	0%	2%	2%	33%
Ca	22%	12%	35%	14%	16%
Mg	10%	16%	65%	4%	4%
S	0%	8%	88%	4%	0%
B	41%	4%	4%	6%	45%
Cu	37%	4%	27%	14%	18%
Fe	55%	0%	0%	8%	37%
Mn	55%	2%	4%	0%	39%
Zn	76%	0%	0%	0%	24%

1119
 1120 Com base na distribuição de frequência dos nutrientes, verifica-se que em 88% das
 1121 amostras o teor de enxofre no feijão está suficiente, o que contrapõe o resultado obtido quando
 1122 interpretado pela literatura de Malavolta (1997), que seria de 98% das amostras, estariam com
 1123 deficiência de enxofre para a cultura do feijão.

1124 Os nutrientes que apresentaram maior distribuição nas classes de deficiência foram:
 1125 potássio e zinco, 63% e 76% respectivamente. Já os nutrientes que estão interferindo no
 1126 equilíbrio nutricional das plantas de feijão devido estar em níveis acima que a suficiência são:
 1127 nitrogênio e boro. Isso se deve as consecutivas aplicações com os nutrientes em questão, ambas
 1128 aplicações em cobertura. Nesse caso, a operação agrícola de aplicação poderia ser economizada

1129 visto que os teores já estão altos nas plantas, evidenciando a importância das faixas de
1130 suficiência regionalizada.

1131

1132 4. CONCLUSÕES

1133 O DRIS estabelece critérios regionais de faixas de suficiência para a cultura do feijão
1134 semeado na primeira safra de forma eficiente;

1135 As faixas de suficiência estabelecidas pelo DRIS se diferem das faixas de suficiência já
1136 presentes na literatura, constituindo uma ferramenta de grande importância para avaliação do
1137 estado nutricional do feijão.

1138 O DRIS permite identificar quais são os nutrientes que estão causando maior
1139 desequilíbrio na cultura e dessa forma buscar formas de minimizar os danos nutricionais.

1140

1141 5. REFERENCIAS

1142 BEAUFILS, E. R. Physiological diagnosis: a guide for improving maize production based on
1143 principles developed for rubber trees. *Fertilizer Society of South African Journal*, 1971. 1 v. 1
1144 n. 1-30 p.

1145 BEAUFILS, E.R. Diagnosis and recommendation integrated system (DRIS): a general scheme
1146 for experimentation and calibration based on principles developed from research in plant
1147 nutrition. *Soil Science bulletin*, 1973. 132 p..

1148 CASTAMANN, A. et al. Diagnosis and recommendation integrated system (DRIS) of soybean
1149 oil content. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, 2012. 36 v. 1820-1827 p.

1150 COBRA NETO, A. et al. *Estudos sobre a nutrição mineral do feijoeiro*. Anais da Escola
1151 Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 1971. 28 v. 257-274 p.

1152 COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
1153 *Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais*, 1999. 359p. (5ª
1154 aproximação).

1155 CONAB | Acompanhamento da safra brasileira de grãos | v. 4 - Safra 2016/17, n.12 - Décimo
1156 segundo levantamento, setembro 2017. Disponível em:
1157 <https://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_09_12_09_01_56_boletim_graos
1158 [_setembro_2017.pdf](https://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_09_12_09_01_56_boletim_graos_setembro_2017.pdf)>. Acesso em: 29 nov. 2017.

1159 CONAB | Acompanhamento da safra brasileira de grãos | v. 5 - Safra 2017/18, n.5 - Quinto
1160 segundo levantamento, fevereiro 2018. Disponível em:
1161 <http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/18_02_08_17_09_36_fevereiro_2018
1162 [.pdf](http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/18_02_08_17_09_36_fevereiro_2018.pdf)>. Acesso em: 20 fev. 2018.

1163 COSTA, A. N. Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação (DRIS). In: *DRIS: Um aliado*
1164 *no diagnostico nutricional de plantas*, 24., 1999, Viçosa. Boletim Informativo... Viçosa: SBCS,
1165 1999. 13-15 p.

1166 CRESTE, J. E.; ECHER, F. R. Establishing standards for the integrated recommendation and
1167 diagnosis system (DRIS) for irrigated bean crops. *Commun. Soil Science and Plant Analysis*,
1168 2010. 41 v. 16 n. 1921-1933 p.

1169 DIAS, J. R. M. et al. Normas DRIS para cupuaçuzeiro cultivado em monocultivo e em sistemas
1170 agrofloretais. *Pesquisa agropecuária brasileira*, 2010. 45 v. 1 n. 64-71 p.

1171 GUIMARÃES, F. C. N. *Normas DRIS e diagnóstico nutricional de cana sola na região sul de*
1172 *Goiás*. Teses (Mestrado) – Universidade Federal da Grande Dourados, 2014.

1173 GUIMARÃES, P. T. G. et al. Faixas críticas de concentrações de nutrientes e avaliação do
1174 estado nutricional de cafeeiros em quatro regiões de Minas Gerais. *Pesquisa Agropecuária*
1175 *Brasileira*, 2003. 38 v. 6 n. 703-713 p.

1176 HIROCE, R. et al. Análise foliar em feijoeiro. *Bragantia*, 1970. 29 v. 3 n. 7-12 p.

1177 JONES, W. W. Proposed modifications of the diagnosis and recommendation integrated system
1178 (DRIS) for interpreting plant analyses. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*,
1179 1981. 12 v. 20 n. 785-794 p.

1180 LEANDRO, W. M. *Sistema integrado de diagnose e recomendação (DRIS) para a cultura da*
1181 *soja (Glycine max L. Merrill) na região de Rio Verde- GO*. Universidade Federal de Goiás,
1182 Goiânia, 1998. Tese (Doutorado em Agronomia) 190 f.

1183 LETZSCH, W.S. Computer program for selection of norms for use in the diagnosis and
1184 recommendation integrated system (DRIS). *Communications in Soil Science and Plant*
1185 *Analysis*, 1985. 16 v. 339-347 p.

1186 MALAVOLTA, E. et al. *Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações*.
1187 Potafos, 1997. 319 p.

1188 MALAVOLTA, E. et al. *Avaliação do estado nutricional das plantas; princípios e aplicações*.
1189 Potafos, 1989. 201 p.

1190 MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants. Academic, 1995. 889 p.

1191 MESQUITA, M. A. M. Estado nutricional e normas DRIS para o feijoeiro irrigado em
1192 Cristalina, Goiás. Escola de Agronomia – Universidade Federal de Goias. Tese de Doutorado
1193 em Agronomia, f. 105, 2013.

1194 NEEDHAM, T. D. et al. Relationship between diagnosis and recommendation integrated
1195 system (DRIS) optima and foliar nutrient critical levels. *Soil Science Society of America*
1196 *Journal*, 1990. 54 v. 883-886 p.

1197 OLIVEIRA, S. A. Avaliação do balanço nutricional no sistema solo - planta pelo DRIS. In:
1198 *Simposio sobre fertilidade do solo em plantio direto*, 1997. EMBRAPA-CPAO (Documentos,
1199 22). 1998. 81-87 p.

1200 OLIVEIRA, S. A. Avaliação do balanço nutricional no sistema solo-planta. In: *Congresso*
1201 *brasileiro de ciência do solo*, 24.,1993. **Anais...**Goiânia: Sociedade Brasileira de Ciência do
1202 Solo, 1993. 243-264p.

1203 OLIVEIRA, S. A., SOUSA, D. M. G. Interpretação de análise de solo pelo método DRIS
1204 (Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação). In: *Reunião brasileira de fertilizadade do*
1205 *solo*, 18., 1988. **Anais...** Guarapari: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1988. 47-48 p.

1206 PAIVA JÚNIOR, E. F. *Padrões foliares e de solo para a cultura do feijoeiro comum no vale*
1207 *do Rio dos Bois, Goiás*. Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal
1208 de Goiás. Dissertação (Mestrado em Agronomia) 2011.79 p.

1209 PARTELLI, F. L. et al. Avaliação nutricional de feijoeiro irrigado pelos métodos CND, DRIS
1210 e faixas de suficiência. *Revista Brasileira de Ciência do solo*, 2014. 38 v. 3 n. 858-866 p.

1211 RAIJ, B. V. Fertilidade do solo e adubação. Editora Agronômica Ceres, 1991. 343 p.

1212 RAIJ, B. V. *Fertilidade do solo e adubação*. Editora Agronômica Ceres, 1991. 343 p

1213 REZENDE, C. F. A. *Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação (DRIS) em produção de*
1214 *mudas de citrus*. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Goiás, Escola de Agronomia,
1215 2014.

1216 ROSOLEM, C.A.; MARUBAYASHI, O.M. Seja o doutor do seu feijoeiro. *Encarte do*
1217 *Informações Agronômicas*, 1994. 68 n. 16 p.

1218 SERRA, A. P. er al. Establishing DRIS norms for cotton with different selection criteria for the
1219 reference population. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, 2013. 48 v. 1472-1480 p.

1220 SERRA, A. P. et al. Desenvolvimento de normas DRIS e CND e avaliação do estado nutricional
1221 da cultura do algodoeiro. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, 2010. 34 v. 97-104 p.

1222 VIEIRA, S. R. et al. Variabilidade espacial dos teores foliares de nutrientes e da produtividade
1223 da soja em dois anos de cultivo em um latossolo vermelho. *Revista Brasileira Científica do*
1224 *Solo*, 2010. 34 v. 5 n. 1503-1514 p.

1225 WALWORTH, J. .L.; SUMNER, M. E. The diagnosis and recommendation system (DRIS).

1226 *Adv. Soil Science*, 1987. 6 v. 149-188 p.

1227

APÊNDICES

Apêndice A:	Valores da análise de solo na profundidade de 0,0-0,20 m e 0,20-0,40 m para pH, macronutrientes e micronutrientes das glebas formadas para o experimento no município de Montividiu, GO, 2017.	70
Apêndice B:	Classes de interpretação para pH, V, Ca, Mg, S, B, Cu, Mn, Zn e Fe, obtidos pela análise de solo.....	71

Apêndice A. Valores da análise de solo na profundidade de 0,0-0,20 m e 0,20-0,40 m para pH, macronutrientes e micronutrientes das glebas formadas para o experimento no município de Montividiu, GO, 2017.

Gleba	Prof. (cm)	pH	P	S	K	Ca	Mg	Al	H+Al	B	Cu	Fe	Mn	Zn
		(CaCl ₂)	Resina -----mg dm ⁻³ -----	-----cmolc dm ⁻³ -----					-----mg dm ⁻³ -----					
6	0-20	4,70	42,20	19,00	0,44	3,50	1,10	0,00	3,00	0,47	1,36	40,00	22,20	3,71
6	20-40	4,80	24,60	66,00	0,27	3,20	0,80	0,00	4,00	0,32	0,70	28,00	7,30	18,56
4	0-20	4,80	64,00	49,00	0,59	2,80	0,50	0,17	3,30	0,56	1,20	35,00	24,70	2,69
4	20-40	4,80	16,80	176,00	0,47	3,30	0,50	0,00	2,80	0,35	0,70	21,00	10,80	12,55
5	0-20	4,90	74,00	23,00	0,38	3,50	0,60	0,00	3,20	0,49	1,10	19,00	30,90	3,80
5	20-40	4,80	23,90	121,00	0,18	3,30	0,30	0,00	3,60	0,39	0,70	17,00	17,00	15,49
1	0-20	4,40	68,40	77,00	0,28	3,60	1,00	0,16	4,30	0,60	1,81	27,00	11,93	2,35
1	20-40	4,90	16,00	163,00	0,18	2,60	0,50	0,00	4,10	0,51	0,94	14,00	3,57	1,17
2	0-20	4,70	46,90	18,00	0,18	3,70	0,70	0,00	3,00	0,32	0,79	34,00	4,57	2,16
2	20-40	5,00	18,50	36,00	0,15	2,50	0,40	0,00	3,50	0,41	0,80	26,00	3,10	8,07
3	0-20	5,20	29,90	29,00	0,24	3,70	0,70	0,00	3,20	0,36	0,85	25,00	7,55	2,77
3	20-40	5,10	21,30	38,00	0,20	2,60	0,50	0,00	2,10	0,34	0,73	20,00	3,74	15,24
7	0-20	4,40	47,10	27,00	0,14	1,80	0,30	0,21	6,10	0,20	1,02	17,00	11,83	1,30
7	20-40	4,10	6,90	83,00	0,10	0,70	0,10	0,21	4,50	0,17	0,96	20,00	9,18	0,12

Apêndice B. Classes de interpretação para pH, V, Ca, Mg, S, B, Cu, Mn, Zn e Fe, obtidos pela análise de solo.

Variável	Classes de Interpretação				
	Baixa	Média	Adequada	Alta	Muito Alto
pH (H ₂ O) ¹	< 5,1	5,2-5,5	5,6-6,3	6,4-6,6	≥ 6,7
V ¹	≤ 20	21-35	36-60	61-70	≥ 71
Ca (cmolc dm ⁻³) ¹	< 1,5	-	1,5-7,0	> 7,0	-
Mg (cmolc dm ⁻³) ¹	< 0,5	-	0,5-2,0	> 2,0	-
S (mg dm ⁻³) ¹	≤ 4,0	5,0-9,0	-	≥ 10,0	-
B (mg dm ⁻³) ¹	< 0,2	0,3-0,5	-	> 0,5	-
Cu (mg dm ⁻³) ¹	< 0,4	0,5-0,8	-	> 0,8	-
Mn (mg dm ⁻³) ¹	< 1,9	2,0-5,0	-	> 5,0	-
Zn (mg dm ⁻³) ¹	< 1,0	1,1-1,6	-	> 1,6	-
Fe (mg dm ⁻³) ²	< 0,5	0,5-12,0	-	> 12,0	-

¹ Souza & Lobato (2004); ² Comissão de Fertilidade do Solo de Goiás (1988).

REVISTA PESQUISA AGROPECUARIA TROPICAL (PAT)

Diretrizes para Autores

Pesquisa Agropecuária Tropical (PAT) é o periódico científico trimestral editado pela Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás, em versão eletrônica (e-ISSN 1983-4063). Destina-se à publicação de Artigos Científicos cuja temática tenha aplicação direta na agricultura tropical. Logo, a vinculação indireta do objeto de estudo com essa temática não é razão suficiente para que uma submissão seja aprovada para seguir no processo editorial deste periódico. Notas Técnicas, Comunicações Científicas e Artigos de Revisão somente são publicados a convite do Conselho Editorial.

A submissão de trabalhos é gratuita e deve ser feita exclusivamente via sistema eletrônico, acessível por meio do endereço www.agro.ufg.br/pat ou www.revistas.ufg.br/index.php/pat. Os autores devem manifestar, por meio de documento ([ver sugestão de modelo](#)) assinado por todos, escaneado e inserido no sistema como documento suplementar, anuência acerca da submissão e do conhecimento da política editorial e diretrizes para publicação na revista PAT (caso os autores morem em cidades diferentes, mais de um documento suplementar pode ser inserido no sistema, pelo autor correspondente).

A revista PAT recomenda a submissão de artigos com, no máximo, 5 (cinco) autores. A partir deste número, uma descrição detalhada da contribuição de cada autor deve ser encaminhada ao Conselho Editorial (lembre-se de que, às vezes, a seção “Agradecimentos” é mais apropriada que a autoria).

Durante a submissão *on-line*, o autor correspondente deve atestar, ainda, em nome de todos os autores, a originalidade e ineditismo do trabalho (trabalhos já disponibilizados em anais de congresso não são considerados inéditos, por tratarem-se de uma forma de publicação e ampla divulgação dos resultados), a sua não submissão a outro periódico, a conformidade com as características de formatação requeridas para os arquivos de dados, bem como a concordância com os termos da Declaração de Direito Autoral, que se aplicará em caso de publicação do trabalho. Por fim, deve-se incluir os chamados metadados (informações sobre os autores e sobre o trabalho, tais como título, resumo, palavras-chave – em Português e Inglês) e transferir os arquivos com o manuscrito e documento suplementar (anuência dos autores).

Se o trabalho envolveu diretamente animais ou seres humanos como sujeitos da pesquisa, deve-se comprovar a sua aprovação prévia por um comitê de ética em pesquisa.

Os trabalhos podem ser escritos em Português ou Inglês, entretanto, **serão publicados apenas em Inglês**. Logo, em caso de submissão em Português e aprovação para publicação, a versão final do manuscrito deverá ser traduzida por especialista em Língua Inglesa (preferencialmente falante nativo), sendo que a tradução ficará a cargo dos autores, sem qualquer ônus para a revista.

Os manuscritos devem ser apresentados em até 18 páginas, com linhas numeradas. O texto deve ser editado em *Word for Windows* (tamanho máximo de 2MB, versão .doc) e digitado em página tamanho A-4 (210 mm x 297 mm), com margens de 2,5 cm, em coluna única e espaçamento

duplo entre as linhas (inclusive para tabelas, cabeçalhos e rodapés). A fonte tipográfica deve ser *Times New Roman*, corpo 12. O uso de destaques como negrito e sublinhado deve ser evitado. Todas as páginas devem ser numeradas. Os manuscritos submetidos à revista PAT devem, ainda, obedecer às seguintes especificações:

1. Os Artigos Científicos devem ser estruturados na ordem: *título*(máximo de 20 palavras); *resumo*(máximo de 250 palavras; um bom resumo primeiro apresenta o problema para, depois, apresentar os objetivos do trabalho); *palavras-chave*(no mínimo, três palavras, e, no máximo, cinco, separadas por ponto-e-vírgula); *Introdução*; *Material e Métodos*; *Resultados e Discussão*; *Conclusões*; *Agradecimentos*(se necessário, em parágrafo único) e *Referências*. Chamadas relativas ao título do trabalho e os nomes dos autores, com suas afiliações e endereços (incluindo *e-mail*) em notas de rodapé, bem como agradecimentos, somente devem ser inseridos na versão final corrigida do manuscrito, após sua aceitação definitiva para publicação.

2. As citações devem ser feitas no sistema “autor-data”. Apenas a inicial do sobrenome do autor deve ser maiúscula e a separação entre autor e ano é feita somente com um espaço em branco. Ex.: (Gravena 1984, Zucchi 1985). O símbolo “&” deve ser usado no caso de dois autores e, em casos de três ou mais, “et al.”. Ex.: (Gravena & Zucchi 1987, Zucchi et al. 1988). Caso o(s) autor(es) seja(m) mencionado(s) diretamente na frase do texto, utiliza-se somente o ano entre parênteses. Citações de citação (citações secundárias) devem ser evitadas, assim como as seguintes fontes de informação: artigo em versão preliminar (no prelo ou *preprint*) ou de publicação seriada sem sistema de arbitragem; resumo de trabalho ou painel apresentado em evento científico; comunicação oral; informações pessoais; comunicação particular de documentos não publicados, de correios eletrônicos, ou de *sites*particulares na Internet.

3. As referências devem ser organizadas em ordem alfabética, pelos sobrenomes dos autores, de acordo com a norma NBR 6023:2002, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com a seguinte adequação: não é necessária a inclusão da cidade após os títulos de periódicos. Os destaques para títulos devem ser apresentados em *itálico* e os títulos de periódicos não devem ser abreviados.

4. As tabelas (também com corpo 12 e espaçamento duplo) e figuras (dispostas no decorrer do texto) devem ser identificadas numericamente, com algarismos arábicos, e receber chamadas no texto. As tabelas devem ser editadas em preto e branco, com traços simples e de espessura 0,5 ponto (padrão *Word for Windows*). As figuras devem ser apresentadas com resolução mínima de 300 dpi.

5. A consulta a trabalhos recentemente publicados na revista PAT (www.agro.ufg.br/pat ou www.revistas.ufg.br/index.php/pat) é uma recomendação do corpo de editores, para dirimir dúvidas sobre estas instruções e, conseqüentemente, agilizar a publicação.

6. Os autores não serão remunerados pela publicação de trabalhos na revista PAT, pois devem abrir mão de seus direitos autorais em favor deste periódico. Os conteúdos publicados, contudo, são de inteira e exclusiva responsabilidade de seus autores, ainda que reservado aos editores o direito de proceder a ajustes textuais e de adequação às normas da publicação. Por outro lado, os autores ficam autorizados a publicar seus artigos, simultaneamente, em repositórios da instituição de sua origem, desde que citada a fonte da publicação original na revista PAT.

7. Endereço e contatos:

Pesquisa Agropecuária Tropical (PAT) Escola de Agronomia Universidade Federal de Goiás
Caixa Postal 131 - Campus II (Samambaia) CEP 74.001-970 - Goiânia, GO – Brasil *E-mail:* gilsonrevistaufg@gmail.com Telefone: (62) 3521-1552 *Homepage:*
<http://www.agro.ufg.br/pat> ou www.revistas.ufg.br/index.php/pat